

初级护师考试：《答疑周刊》2022 年第 9 期

1. 【问题】患者，男，69 岁。高血压病史 6 年，糖尿病病史 2 年，血压曾为 170/105mmHg，有吸烟、饮酒嗜好。【医学教育网原创】根据以上情况，该患者的预后判断是

- A. 高血压，多极低危组
- B. 高血压，低危组
- C. 高血压，中危组
- D. 高血压，高危组
- E. 高血压，很高危组

【正确答案】D

【学员问题】学员不知道这道题怎么选择？

【解答】该患者为 II 级高血压，同时存在 3 个以上危险因素，但不存在靶器官功能损害，属于高危患者。【医学教育网原创】

根据高而压水平和危险因素决定预后

危险分层	高血压 I 级 (140~159/90~99)	高血压 II 级 (160~179/100~109)	高血压 III 级 ( $\geq 180/ \geq 110$ )
低危险层	不伴有危险因素		
中危险层	伴 1~2 个危险因素	不伴或伴有 1 个危险因素	
高危险层	伴 3 个危险因素或有靶器官损害		
极高危险层	有靶器官损害或有相关临床表现 【医学教育网原创】		仅有 III 级高血压

2. 【问题】左心室后负荷增高的主要原因是

- A. 血容量增加过速
- B. 慢性肺气肿
- C. 左心室流出道狭窄
- D. 主动脉返流
- E. 体循环动脉高压

【正确答案】E

【学员问题】学员不知道此题该如何选择？

【解答】左心室后负荷增高的主要原因是体循环动脉高压。

(1) 容量负荷(前负荷)过重：见于二尖瓣、主动脉瓣关闭不全；房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭；以及伴有全身血容量增多疾病，如甲状腺功能亢进症、慢性贫血等。【医学教育网原创】

(2) 压力负荷(后负荷)过重：见于高血压、主动脉瓣狭窄、肺动脉高压、肺动脉瓣狭窄等，以及左、右心室收缩期射血阻力增加的疾病。

3. 【问题】休克的程度划分？

【解答】休克的临床表现

分期	程度	神志	口渴	皮肤黏膜		脉搏	血压	体表血管	尿量	估计失血量
				色泽	温度					
休克代偿期	轻度	神志清楚，伴有痛苦表情，精神紧张	明显	开始苍白	正常或发凉	100次/分以下，尚有力	收缩压正常或稍升高，舒张压增高，脉压缩小	正常	正常	<20% (<800ml)
休克抑制期	中度	神志尚清楚，表情淡漠	很明显	苍白	发冷	100~120次/分	收缩压为90~70mmHg，脉压小	表浅静脉塌陷，毛细血管充盈迟缓	尿少	20%~40% (800~1600ml)
	重度	意识模糊，神志不清，昏迷	非常明显，可能无主诉	显著苍白，肢端青紫	湿冷(肢端更明显)	速而细弱，或摸不清	收缩压<70mmHg或测不到【医学教育网原创】	毛细血管充盈更迟缓，表浅静脉塌陷	尿少或无尿	>40%(>1600ml)

4. 【问题】过敏试验液浓度总结

【解答】

皮试液名称	每 1ml 含量	每 0.1ml 含量
青霉素	200U~500U	20U~50U
链霉素	2500U	250U
破伤风抗毒素	150U	15U
0.25%普鲁卡因	2.5mg	0.25mg
细胞色素 C	0.75mg	0.075mg
头孢菌素	500ug	50ug

