

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2022年第41期

问题索引:

1. 【问题】羊水栓塞和人工流产综合征怎么区分?
2. 【问题】原发性肝癌最容易转移的部位是?
3. 【问题】血栓闭塞性脉管炎病变主要位于?
4. 【问题】胃溃疡和十二指肠未穿孔的情况下一般需不需要手术?

具体解答:

1. 【问题】羊水栓塞和人工流产综合征怎么区分?

【解答】人工流产综合征:在施行人工流产手术中,由于子宫体、宫颈受机械性刺激导致迷走神经兴奋冠状动脉痉挛、心脏传导功能障碍所致。[医学教育/网]出现心动过缓,心律不齐等,血压下降、面色苍白、出汗、胸闷甚至发生昏厥和抽搐。

羊水栓塞是指在由于羊水进入母体血液循环,而引起的肺动脉高压、低氧血症、循环衰竭、弥散性血管内凝血(DIC)以及多器官功能衰竭等一系列病理生理变化的过程。发病突然,出现烦躁不安、寒战、恶心、呕吐、气急等先兆症状,继而出现呛咳、呼吸困难、发绀,迅速出现循环衰竭,进入休克或昏迷状态,严重者发病急骤,可于数分钟内迅速死亡。

人工流产综合征和羊水栓塞两者主要在体征上的区别在前者的血压下降不如后者下降迅速,前者会出现出汗。

2. 【问题】原发性肝癌最容易转移的部位是?

【解答】原发性肝癌容易侵犯门静脉分支,癌栓经门静脉系统在肝内转移。[医学教育/网]肝外血行转移依次见于肺、骨、脑等;因此原发性肝癌最容易转移的部位是肝内。

3. 【问题】血栓闭塞性脉管炎病变主要位于?

【解答】血栓闭塞性脉管炎,是一种进行缓慢的累及周围血管的炎症和闭塞性病变,主要侵及四肢中小动静脉,尤其是下肢血管,好发于青壮年男性。主要侵犯

下肢，病变主要累及中小动脉，并常伴有游走性静脉炎。

4. 【问题】胃溃疡和十二指肠未穿孔的情况下一般需不需要手术？

【解答】不需要，空腹状态下溃疡穿孔，症状轻，腹膜炎较局限；病人一般情况好，可采用非手术治疗。若经非手术治疗 6~8 小时后病情不见好转反而加重者，应改手术治疗。[医学教育网]大多数胃十二指肠溃疡大出血经非手术治疗止血，或行急诊胃镜止血。手术指征为：①严重大出血，短期内出现休克；②经非手术治疗出血不止或暂时止血又复发；③60 岁以上的老年病人，血管硬化，难以自止；④不久前曾发生过类似大出血；⑤同时存在溃疡穿孔或幽门梗阻。大多数溃疡出血的病人行胃大部切除术，在病情危急时，可采用贯穿缝扎术止血。