

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2022年第54期

问题索引：

1. 【问题】护患沟通时，不适当的沟通方式有哪些？
2. 【问题】破伤风类毒素与破伤风抗毒素的区别是什么？
3. 【问题】支气管哮喘和心源性哮喘怎么区分呢？
4. 【问题】胰腺炎病人腹痛的部位是在哪？

具体解答：

1. 【问题】护患沟通时，不适当的沟通方式有哪些？

【解答】不适当的沟通方式常见的有：突然改变话题、急于陈述自己的观点、匆忙下结论或表达个人的判断、[医学教育网原创]虚假或不适当的安慰、针对性不强的解释、引用事实不当等。

2. 【问题】破伤风类毒素与破伤风抗毒素的区别是什么？

【解答】破伤风类毒素是将破伤风毒素用甲醛脱敏制得的类毒素，是一种抗原，可用于预防破伤风。

破伤风抗毒素是用对[医学教育网原创]破伤风病具有免疫力的人或动物血清经加工精制而成的免疫抗体，注射到人体后，可直接对破伤风起到抵抗的作用，但这种抗毒素是被动的，而且在体内只能维持很短时间。

因此，预防破伤风最根本的措施还是注射破伤风类毒素，以使体内产生自动免疫抗体，从而达到长久的预防破伤风的目的。

3. 【问题】支气管哮喘和心源性哮喘怎么区分呢？

【解答】心源性哮喘是由于左心衰竭和急性肺水肿等引起的发作性气喘，其发作时的临床表现可与支气管哮喘相似。[医学教育网原创]心源性哮喘既往有高血压或心脏病历史，哮喘时，伴有频繁咳嗽、咳泡沫样特别是血沫样痰，心脏扩大，心律失常和心音异常等。两者的症状相似，但病因不同。

4. 【问题】胰腺炎病人腹痛的部位是在哪？

【解答】胰腺炎病人出现腹痛的位置与病变部位有关

胰头部：以右上腹为主，向右肩部放射；

胰体部：以上腹部正中为主；

胰体尾部：以左上腹为主，向左肩部放射；

全胰：呈腰带状疼痛，向腰背部放射。



正保医学教育网

www.med66.com