

医学教育网护士执业资格：《答疑周刊》2022年第55期

问题索引：

1. 【问题】漏出液与渗出液的发生机制有什么不同。
2. 【问题】癫痫大发作与癫痫小发作区别。
3. 【问题】墙面以及地面的消毒方法究竟是喷雾法还是擦拭法？
4. 【问题】妇科中讲的四步触诊法分别扣哪里？

具体解答：

1. 【问题】漏出液与渗出液的发生机制有什么不同。

【解答】

积液	发生机制	常见原因
漏出液	毛细血管流体静压增高	静脉回流受阻、充血性心力衰竭和晚期肝硬化
	血浆胶体渗透压减低	血浆清蛋白浓度明显减低的各种疾病
	淋巴回流受阻	丝虫病、肿瘤压迫等所致的淋巴回流障碍
	钠水潴留	充血性心力衰竭、肝硬化和肾病综合征
渗出液	微生物的毒素、缺氧以及炎性介质	结核性、细菌性感染
	血管性物质增高、癌细胞浸润	转移性肺癌、乳腺癌、淋巴瘤、卵巢癌
	外伤、化学物质刺激等	血液、胆汁、胰液和胃液等刺激，外伤

2. 【问题】癫痫大发作与癫痫小发作区别。

【解答】失神发作：通常称小发作，多见于儿童，病人突然意识短暂丧失，停止当时的活动，呼之不应，两眼瞪视不动，一般不会跌倒，手中持物可坠落，持续5~10秒后立即清醒，继续原先的活动，但对发作无记忆。

全面强直-阵挛发作：又称大发作，是最常见的发作类型之一，以意识丧失和双侧强直后出现阵挛为临床特征。发作前可有前驱症状如头晕、气血上涌、上

腹部异常感、幻觉等，发作分3期。强直期：病人突然意识丧失，跌倒在地，全身骨骼肌呈持续性收缩，表现为眼球上翻、喉部痉挛发出尖叫、口先强张而后突闭、颈部和躯干先屈曲后反张、上肢屈曲、双拇指对掌握拳、下肢伸直、呼吸暂停、瞳孔散大及对光反射消失，此期持续30~60秒，可有跌倒、外伤、尿失禁。阵挛期：全身肌肉节律性一张一弛地抽动、阵挛频率由快变慢，松弛期逐渐延长，最后一次强烈阵挛后抽搐突然终止，但意识、呼吸、瞳孔均无恢复，此期持续约1分钟。以上2期均可见心率增快、血压升高、唾液和支气管分泌物增多。发作后期：抽搐停止，可自口鼻喷出泡沫或血沫，病人进入昏睡状态，生命体征逐渐恢复正常，然后逐渐清醒，清醒后常感头昏、头痛、全身酸痛和疲乏无力，对发作过程全无记忆，个别病人在完全清醒前可有自动动作或情感变化。自发作开始至意识恢复约历时5~10分钟。

3. 【问题】墙面以及地面的消毒方法究竟是喷雾法还是擦拭法？

【解答】(1) 浸泡法：将被消毒的物品刷洗干净、擦干后浸泡在消毒液内的方法。浸泡时要打开物品的轴节或套盖，带管腔的要在管腔内灌满消毒液。按规定的浓度和时间进行浸泡。

(2) 擦拭法：用化学消毒剂擦拭被污染物体的表面或进行皮肤消毒的方法。如0.5%~1%碘附消毒皮肤，用含氯消毒剂擦拭墙壁、地面等。

(3) 喷雾法：用喷雾器将化学消毒剂均匀地喷洒于空气或物体表面进行消毒的方法。用于地面、墙壁、环境等的消毒。喷洒时物体表面湿透才能达到消毒作用。

(4) 熏蒸法：是将消毒剂加热或加入氧化剂，使其产生气体进行消毒的方法。如手术室、病室的空间消毒。在消毒间或密闭容器内，也可用熏蒸法对污染物品进行消毒灭菌。临床常用甲醛、环氧乙烷气体进行消毒灭菌。

4. 【问题】妇科中讲的四步触诊法分别扣哪里？

【解答】

