

医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2023年第21期

问题索引:

1. 细菌性痢疾和阿米巴痢疾的鉴别要点是什么?
2. 劳风的主要症状是什么?
3. 乳癖的乳房肿块特点是什么?

具体解答:

1. 细菌性痢疾和阿米巴痢疾的鉴别要点是什么?

鉴别细菌性痢疾和阿米巴痢疾最可靠的依据是

- A. 潜伏期的长短
- B. 毒血症状的轻重
- C. 大便常规检查红白细胞计数
- D. 大便检出病原体
- E. 抗生素治疗是否有效

【答案】 D

【解析】 大便检出病原体是鉴别细菌性痢疾和阿米巴痢疾最可靠的依据[医学教育网原创]。

细菌性痢疾与阿米巴痢疾的鉴别

鉴别要点	阿米巴痢疾	急性细菌性痢疾
病原	溶组织内阿米巴原虫	志贺菌
流行方式	散发	散发或流行或暴发
潜伏期	数周至数月	1~7日
全身症状	起病缓, 全身中毒症状轻或无, 多无发热	起病急, 全身中毒症状重, 多有发热
腹痛	轻, 右下腹	重, 左下腹
腹泻	较轻	重

里急后重	不明显	明显
大便肉眼	暗红，果酱样，有腥臭味	黏液或脓血便
大便镜检	红细胞多于白细胞，可见夏科-雷登结晶	大量白细胞、少量红细胞及吞噬细胞
大便培养	阿米巴滋养体或包囊	有志贺菌阳性
结肠镜检查	病变主要在结肠回盲部及升结肠，见散发潜行溃疡，周围红晕，溃疡间肠黏膜正常	病变以乙状结肠及直肠为主，肠黏膜弥漫性充血、水肿、浅表溃疡

2. 劳风的主要症状是什么？

《素问·评热病论》中，劳风的主要症状不包括

- A. 恶风振寒
- B. 唾出若涕
- C. 咳出青黄痰块
- D. 呼吸喘促
- E. 强上冥视

【答案】D

【解析】原文：劳风法在肺下，其为病也，使人强上冥视，唾出若涕，恶风而振寒，此为劳风之病。帝曰：治之奈何？岐伯曰：以救俯仰。巨阳引。精者三日，中年者五日，不精者七日。咳出青黄涕，其状如脓，大如弹丸，从口中若鼻中出，不出则伤肺，伤肺则死也[医学教育网原创]。

(1) 劳风的病因病机：劳风的病因为因劳而虚，因虚而受风，邪气化热壅肺；病机为太阳受风，卫阳郁遏，肺失清肃，痰热壅积。

(2) 劳风的症状：劳风的主要症状为恶风振寒，强上冥视，唾出若涕，甚则咳出青黄痰块。

(3) 劳风的治疗：劳风的治疗宜利肺散邪以救俯仰，排出痰液以通气道；治则为针刺太阳以引经气。因势利导的排痰祛邪之法对于劳风的治疗至关重要

[医学教育网原创]。

3. 乳癖的乳房肿块特点是什么?

关于乳癖肿块的特点, 不正确的是

- A. 可单侧发生
- B. 质地中等
- C. 多伴有压痛
- D. 与皮肤粘连
- E. 活动度好

【答案】 D

【解析】 乳癖的乳房肿块可发生于单侧或双侧, 大多位于乳房的外上象限, 也可见于其他象限。肿块的质地中等或质硬不坚, 表面光滑或颗粒状, 活动度好, 大多伴有压痛。肿块的大小不一, 一般在 1~2cm, 大者可超过 3cm[医学教育网原创]。