

医学教育网儿科主治医师:《答疑周刊》2024年第38期

新生儿破伤风典型的表现不难记忆,但考试主要还考察破伤风的细节,如潜伏期、治疗等,本期通过习题的形式带大家了解相关的内容。

问题索引:

1. 新生儿破伤风的潜伏期?
2. 新生儿破伤风的临床表现?
3. 新生儿破伤风的治疗?

具体解答:

1. 新生儿破伤风的潜伏期?

新生儿破伤风的潜伏期为

- A. 1~2月
- B. 2~3月
- C. 1~2天
- D. 4~7天
- E. 2周~1月

【答案】D

【解析】新生儿破伤风一般在生后4~7天发病,首发症状表现为不能吮乳,早期可有哭闹、烦躁不安,继而牙关紧闭、眉举额皱、口角上牵,出现苦笑面容。病情进展出现全身抽搐。此过程发展甚快,多在24小时内完成。

2. 新生儿破伤风的临床表现?

患儿为家中急产娩出,生后5天,出现牙关紧闭、全身肌张力增高、苦笑面容,该患儿的诊断为

- A. 新生儿脑膜炎
- B. 新生儿破伤风
- C. 新生儿缺氧缺血性脑病
- D. 新生颅内出血

E. 新生儿败血症

【答案】 B

【解析】 生后 7 天内出现吮乳困难或肌张力增高, 伴有抽搐者应考虑本病的可能。

3. 新生儿破伤风的治疗?

男孩, 足月出生, 生后 5 天因家人发现不能吸吮母乳就诊。入院后出现苦笑面容、口角上牵。随之出现全身抽搐。入院诊断为破伤风, 请问下述哪项是最佳治疗原则

- A. 注射青霉素
- B. 注射破伤风抗毒素和青霉素、地西洋
- C. 注射破伤风抗毒素和白百破疫苗
- D. 注射破伤风抗毒素
- E. 注射白百破疫苗和青霉素

【答案】 B

【解析】 目的是中和游离的毒素, 所以只在早期有效, 毒素已与神经组织结合, 则难收效。抗生素可选用青霉素肌肉注射, 或大剂量静脉滴注, 可抑制破伤风梭菌。控制痉挛是成功的关键。