

医学教育网中级主管护师：《答疑周刊》2019 年第 3 期

1. 【问题】乙肝疫苗的注射方法？

【解答】乙肝疫苗为肌肉注射。

2. 【问题】不全流产和难免流产怎么区别？

【解答】不全流产 妊娠产物已部分排出体外，尚有部分残留于宫内，阴道出血可持续不止，严重时引起出血性休克，下腹痛减轻。妇科检查：一般子宫小于停经周数，宫颈口已扩张，不断有血液自宫颈口内流出，有时尚可见胎盘组织堵塞宫颈口，或部分妊娠产物已排出于阴道内，而部分仍留在宫腔内，有时宫颈口已关闭。

难免流产 表现为阴道流血量增多，阵发性腹痛加重。妇科检查：子宫大小与停经周数相符或略小，宫颈口已扩张，但组织尚未排出；晚期难免流产还可有羊水流出，或见胚胎组织或胎囊堵于宫口。

3. 【问题】可以同时扩张小动脉和静脉的血管扩展剂是

- A. 硝普钠
- B. 酚妥拉明
- C. 硝酸甘油
- D. 多巴胺
- E. 多巴酚丁胺

【解答】选择 A。硝普钠为动、静扩张剂，宜现用现配，不得与其他药物配伍及应用同一静脉通路。

【学员提问】不是硝酸甘油么？

【解答】硝酸甘油主要药理作用是松弛血管平滑肌。主要用于冠心病心绞痛的治疗及预防，也可用于降低血压或治疗充血性心力衰竭。

4. 【问题】癫痫大发作时，错误的护理措施是

- A. 使病人躺下，侧卧位
- B. 松解领口、腰带
- C. 不可喂水
- D. 牙垫塞入上、下牙之间
- E. 不能强力按压肢体

【解答】选择 D。①病人抽搐发作时，需有专人守护、观察和记录全过程，注意意识状态和

瞳孔的变化，以及抽搐的部位、持续时间、间隔时间等。②对强直-阵挛发作者要扶持病人卧倒，防止跌伤或伤人。③立即解开衣领、衣扣和腰带，迅速将缠有纱布的压舌板或小布卷置于病人一侧上、下白齿间，以防咬伤舌和面颊部。有义齿者必须取出。④不可强行按压或用约束带捆扎抽搐的肢体以防骨折。

【学员提问】为什么侧卧位？

【解答】癫痫大发作时侧卧位的目的是防止呕吐物引起窒息。

【学员提问】如果侧卧位是正确的话仰卧位就是错误的吗？

【解答】仰卧位也可以，但是要头偏向一侧，单纯写仰卧位是错误的。

#### 5. 【问题】稽留热与弛张热的区别？

【解答】稽留热：恒定在 39~40 以上高水平，数天或数周。24 小时波动范围不大于 1 常见于大叶性肺炎，斑疹伤寒及伤寒高热。弛张热又称败血症热型体温常在 39 以上，波动幅度大，24 小时内波动范围超过 2，但都在正常水平上。

弛张热：又称败血症热型。是指体温持续在 39 度以上，波动幅度大，24 小时内体温波动范围超过 2 度，但都在正常水平以上。常见于败血症，风湿热，重症肺结核及化脓性炎症等。

