

一、A1 型题

1. 属足少阴肾经的腧穴是

- A. 血海
- B. 少海
- C. 小海
- D. 照海
- E. 气海

2. 七情内伤致病容易损伤的脏腑是

- A. 心脾肾
- B. 心肝肾
- C. 肺脾肾
- D. 心肝脾
- E. 脾肾肝

3. 肾的“外华”是

- A. 发
- B. 爪
- C. 毛
- D. 面
- E. 唇

4. 推动血液运行的基本动力是

- A. 心的功能
- B. 脾的功能
- C. 肝的功能
- D. 肺的功能
- E. 肾的功能

5. 关于奇经八脉的叙述正确的是

- A. 与五脏六腑有直接的络属关系
- B. 和十二正经相似, 分布规律
- C. 左右对称分布
- D. 调节十二经脉气血
- E. 加强了足三阴、足三阳与心脏的关系

6. 具有加强十二经脉表里两经在体内的联系的经络是

- A. 别络
- B. 经筋
- C. 皮部
- D. 跷脉
- E. 经别

7. 偏食辛温燥热饮食, 则可致

- A. 心肝火旺
- B. 肺胃热盛
- C. 肺胃津伤
- D. 肝经湿热
- E. 肠胃积热

8. 关于瘀血的主要病症特点, 说法错误的是

- A. 疼痛
B. 肿块
C. 出血
D. 唇甲青紫
E. 脉滑数
9. 气的升之太过或降之不及的病理变化为
A. 气滞
B. 气逆
C. 气陷
D. 气闭
E. 气脱
10. 内生“五邪”包括
A. 内风、内暑、内湿、内燥、内火
B. 内风、内寒、内暑、内燥、内火
C. 内风、内寒、内湿、内燥、内火
D. 内风、内寒、内湿、内暑、内热
E. 内风、内寒、内湿、内燥、内暑
11. 具有阴阳互滋互制关系的两脏是
A. 肝与脾
B. 肝与肾
C. 肺与肝
D. 肝与心
E. 脾与肾
12. 在十二经脉中，足之三阳的走向是
A. 从足走头
B. 从手走头
C. 从脏走手
D. 从头走足
E. 从足走腹
13. 根据五行相生规律确定的治法是
A. 滋水涵木法
B. 抑木扶土法
C. 培土制水法
D. 佐金平木法
E. 泻南补北法
14. 心肾不交的治法是
A. 佐金平木
B. 扶土抑木
C. 滋水涵木
D. 培土生金
E. 泻南补北
15. 贯心脉以行血气和下蓄丹田以资先天的是
A. 元气
B. 宗气



- C. 营气
- D. 卫气
- E. 正气

16. 具有繁衍生命, 濡养脏腑, 化血, 化气, 化神功能的是

- A. 精
- B. 气
- C. 血
- D. 津
- E. 液

17. “髓之海”指的是

- A. 脑
- B. 脊柱
- C. 骨
- D. 脉
- E. 胆

18. 部位三焦的中焦包括

- A. 心肺
- B. 肝胆
- C. 大肠
- D. 小肠
- E. 女子胞

19. 在发病过程中, 邪气的作用是

- A. 发病的重要条件
- B. 对疾病无影响
- C. 决定疾病的病程
- D. 决定疾病的性质
- E. 发病的决定因素

20. 下列哪项是“大实有羸状”的病机

- A. 邪实正虚, 正气无力祛除病邪
- B. 实邪结聚于里, 气血不能畅达于外
- C. 阴虚邪恋, 余热不退
- D. 内生五邪兼正气不足
- E. 邪气侵袭, 伤及营卫气血

21. 肺的阴阳属性是

- A. 阴中之阴
- B. 阴中之阳
- C. 阳中之阳
- D. 阳中之阴
- E. 阴中之至阴

22. 下列各项, 属于阳证的是

- A. 表实热证
- B. 里实寒证
- C. 表实寒证
- D. 里虚热证

E. 里实热证

23. “冬伤于寒，春必病温”的发病类型是

- A. 合病
- B. 伏而后发
- C. 感邪即发
- D. 徐发
- E. 继发



24. 具有“五脏六腑之海”之称的是

- A. 督脉
- B. 任脉
- C. 冲脉
- D. 带脉
- E. 维脉



25. 下列属于火的特性的是

- A. 稼穡
- B. 曲直
- C. 从革
- D. 润下
- E. 炎上



26. 与脾土相应的季节是

- A. 秋
- B. 冬
- C. 春
- D. 夏
- E. 长夏



27. 针对“阳虚则寒”产生的虚寒证治疗应

- A. 阴中求阳
- B. 阳中求阴
- C. 阴阳互补
- D. 寒热平调
- E. 寒者热之



28. 五行中，“土”的“所胜”之行是

- A. 木
- B. 火
- C. 土
- D. 金
- E. 水



29. 心为五脏六腑之大主的理论依据是

- A. 心总统魂魄
- B. 心总统意志
- C. 心主血脉
- D. 心主情志
- E. 心主神志



30. 水谷之悍气指的是

- A. 营气
- B. 卫气
- C. 宗气
- D. 水谷之气
- E. 脏腑之气

31. 以下病机中是以阴阳失调来阐释实热或实寒的是

- A. 阴阳偏盛
- B. 阴阳格拒
- C. 阴阳偏衰
- D. 阴阳互损
- E. 阴阳离决

32. 在脾胃的相互关系中, 最根本的是

- A. 脾主升清, 胃主降浊
- B. 胃主纳谷, 脾主磨谷
- C. 脾燥胃湿, 燥湿相济
- D. 胃为水谷之海, 脾为胃行其津液
- E. 太阴湿土得阳始运, 阳明燥土得阴自安

33. 关于藏象的含义, 表述正确的是

- A. 五脏的功能
- B. 六腑的功能
- C. 奇恒之腑的功能
- D. 藏于体内的内脏及其表现于外的生理病理征象
- E. 以上均非

34. “肾为气之根”与肾的下述功能相关的是

- A. 藏精
- B. 主水
- C. 主纳气
- D. 化生元气
- E. 温煦全身

35. 中医治疗出血证时, 常加入一定量的补气药, 其根据是

- A. 气能行血
- B. 气能摄血
- C. 气能生血
- D. 血能生气
- E. 血能载气

36. 瘦长体型者针灸治疗方法正确的是

- A. 进针宜浅
- B. 多用温灸
- C. 刺激量宜大
- D. 进针多捻转
- E. 多用温针艾灸

37. 五脏藏五神, 肾藏

- A. 魄
- B. 志

- C. 魂
- D. 神
- E. 意

38. 足阳明胃经与足太阴脾经交接位置是

- A. 足大趾
- B. 足小趾
- C. 无名指
- D. 食指
- E. 目内眦

39. 小便浑浊、泄泻、下痢、妇女带下, 说明了湿邪

- A. 湿性趋下
- B. 湿性黏滞
- C. 湿性重浊
- D. 湿为阴邪
- E. 易阻气机

40. 暑邪伤人出现气短乏力的症状主要是由于

- A. 暑为阳邪, 其性炎上
- B. 暑性升散, 伤津耗气
- C. 暑多夹湿, 阻遏气机
- D. 暑性升发, 易扰心神
- E. 暑性干涩, 易伤津液

41. 不属于蝉蜕功效的是

- A. 疏散风热
- B. 利咽开音
- C. 明目退翳
- D. 息风止痉
- E. 宣肺祛痰

42. 治疗无汗骨蒸和有汗骨蒸的药物分别是

- A. 地骨皮、牡丹皮
- B. 柴胡、牡丹皮
- C. 地骨皮、胡黄连
- D. 牡丹皮、地骨皮
- E. 青蒿、地骨皮

43. 既可止痛, 又可止呕、止泻功效的药物是

- A. 吴茱萸
- B. 干姜
- C. 丁香
- D. 延胡索
- E. 姜黄

44. 白茅根的功效是

- A. 凉血止血, 散瘀解毒消痈
- B. 凉血止血, 解毒敛疮
- C. 凉血止血, 化痰止咳, 生发乌发
- D. 凉血止血, 清热利尿, 清肺胃热

E. 化瘀止血, 活血定痛

45. 延胡索的功效是

A. 活血行气, 通经止痛

B. 活血, 行气, 止痛

C. 活血行气, 祛风止痛

D. 活血止痛, 行气解郁

E. 活血止痛, 利胆退黄

46. 紫苏子的功效是

A. 降气化痰, 泻肺平喘, 利水消肿

B. 降气化痰, 润肺止咳, 杀虫灭虱

C. 降气化痰, 止咳平喘, 润肠通便

D. 降气化痰, 清肺止咳, 降逆止呕

E. 降气化痰, 润肺下气, 止咳

47. 既可以开窍醒神, 又可以治疗噤口痢的药物是

A. 麝香

B. 苏合香

C. 冰片

D. 石菖蒲

E. 远志

48. 下列各项中不属于黄芪的功效的是

A. 补气健脾

B. 升阳举陷

C. 利水消肿

D. 托毒生肌

E. 补血生津

49. 麦冬的归经叙述正确的是

A. 肺、心、肾

B. 心、肝、脾

C. 肺、心、胃

D. 肺、心、脾

E. 肝、心、肾

50. 硫黄外用治疗的病证是

A. 湿疹

B. 阳痿

C. 杨梅疮

D. 虚喘冷哮

E. 虚寒便秘

51. 牡丹皮与赤芍均具有的功效是

A. 清热凉血, 活血散瘀

B. 清热凉血, 解毒定惊

C. 清热凉血, 解毒透疹

D. 清热凉血, 泻火解毒

E. 清热凉血, 养阴生津

52. 功效为镇惊安神、平肝潜阳、收敛固涩的药物是

- A. 朱砂
- B. 磁石
- C. 龙骨
- D. 琥珀
- E. 远志

53. 下列何药为治疗湿痹及筋脉拘挛的要药

- A. 独活
- B. 羌活
- C. 木瓜
- D. 蕲蛇
- E. 威灵仙

54. 下列各项中具有解鱼蟹之毒功效的药物是

- A. 白芷
- B. 细辛
- C. 紫苏
- D. 香薷
- E. 荆芥

55. 两种功效相似的药物配合应用, 可以增强原有药物的疗效, 这种配伍属于

- A. 相使
- B. 相须
- C. 相反
- D. 相畏
- E. 相恶

56. 功效为行气利水, 杀虫截疟的药物是

- A. 槟榔
- B. 雷丸
- C. 使君子
- D. 莱菔子
- E. 苦楝皮

57. 下列何药为收敛止血的要药

- A. 白及
- B. 小蓟
- C. 三七
- D. 茜草
- E. 地榆

58. 善于清中焦湿热的药物是

- A. 黄芩
- B. 黄连
- C. 黄柏
- D. 苦参
- E. 龙胆草

59. 治疗胃热呕秽, 宜选用

- A. 知母
- B. 芦根

C. 天花粉

D. 夏枯草

E. 石膏

60. 石膏与知母均有的功效是

A. 除烦止渴

B. 消肿排脓

C. 清热利湿

D. 凉血解毒

E. 清热明目

61. 功效为活血调经, 利尿消肿, 清热解毒的药物是

A. 泽兰

B. 红花

C. 蒲公英

D. 败酱草

E. 益母草

62. 牵牛子的功效是

A. 泻水逐饮, 消肿散结

B. 泻下逐水, 去积杀虫

C. 峻下冷积, 逐水退肿

D. 祛痰利咽, 外用蚀疮

E. 润肠通便, 润肺止咳

63. 具有行气止痛, 温中纳气功效的药物是

A. 青皮

B. 沉香

C. 木香

D. 佛手

E. 香附

64. 发热腹痛, 里急后重, 大便有脓血, 舌质红, 脉滑数。治疗宜首选

A. 黄连、木香

B. 黄柏、木香

C. 苦参、木香

D. 马齿苋、木香

E. 黄芩、木香

65. 除哪项外均有下乳作用

A. 山楂

B. 穿山甲

C. 王不留行

D. 通草

E. 漏芦

66. 治疗风湿痹证, 筋骨痿软, 小儿行迟, 体虚乏力, 应首选

A. 秦艽

B. 五加皮

C. 桂枝

D. 白花蛇

E. 防己

67. 具有补血调经, 活血止痛, 润肠通便功效的药物是

A. 当归

B. 白芍

C. 三七

D. 何首乌

E. 阿胶

68. 驱虫药的服用时间是

A. 空腹服

B. 饭后服

C. 定时服

D. 睡前服

E. 饭前服

69. 具有散寒止痛、理气和胃功效的药物是

A. 干姜

B. 高良姜

C. 小茴香

D. 花椒

E. 肉桂

70. 下列哪项是羚羊角、天麻、钩藤的共同功效

A. 息风止痉、平抑肝阳

B. 息风止痉、清肺平喘

C. 息风止痉、清肝明目

D. 息风止痉、祛风通络

E. 息风止痉、清热解毒

71. 桔梗具有的功效为

A. 利气宽胸

B. 燥湿化痰

C. 宣肺祛痰

D. 温肺祛痰

E. 降气止呕

72. 下列药物中不属于配伍禁忌的是

A. 藜芦与赤芍

B. 川贝母与川乌

C. 硫黄与厚朴

D. 水银与砒霜

E. 肉桂与赤石脂

73. 能泻火除烦, 并善于清泻三焦火邪的药物是

A. 石膏

B. 栀子

C. 芦根

D. 夏枯草

E. 金银花

74. 能祛风散寒止痛, 善治巅顶头痛的药物是

- A. 藁本
- B. 白芷
- C. 细辛
- D. 吴茱萸
- E. 苍耳子

75. 具有润肺止咳, 散结消肿功效的药物是

- A. 川贝母
- B. 旋覆花
- C. 百部
- D. 杏仁
- E. 桔梗

76. 茯苓与薏苡仁均有的功效是

- A. 利水渗湿, 宁心安神
- B. 利水渗湿, 补益心脾
- C. 利水渗湿, 消肿排脓
- D. 利水消肿, 渗湿健脾
- E. 利水渗湿, 利尿通淋

77. 属于滑石的功效是

- A. 清肝明目
- B. 清热除痹
- C. 清热解暑
- D. 清热凉血
- E. 清肺化痰

78. 具有开窍醒神, 化湿和胃, 宁神益智功效的药物是

- A. 苏合香
- B. 石菖蒲
- C. 牛黄
- D. 冰片
- E. 麝香

79. 消化性溃疡需紧急手术治疗的并发症是

- A. 门脉高压性胃病
- B. 恶性贫血
- C. 急性胃穿孔
- D. 幽门梗阻
- E. 可疑癌变

80. 慢性型特发性血小板减少性紫癜的首选治疗是

- A. 输注大量免疫球蛋白
- B. 应用免疫抑制剂
- C. 输浓缩血小板
- D. 脾脏切除术
- E. 糖皮质激素

81. 可出现下壁心肌梗死特征性心电图改变的导联是

- A. V_1 、 V_2 、 V_3
- B. I、aVL、 V_5 、 V_6

C. V₃、V₄、V₅

D. II、III、aVF

E. V₁~V₅

82. 局限性非小细胞性肺癌首选的治疗方法是

A. 免疫治疗

B. 中医中药治疗

C. 化学药物治疗

D. 放射治疗

E. 手术治疗

83. 药物及化学物质是继发性再障的首位病因, 最常见的药物是

A. 西咪替丁

B. 抗癫痫药

C. 有机砷

D. 磺胺

E. 氯霉素

84. 我国高血压病患者最主要并发症是

A. 肾脏损害

B. 高血压性心脏病

C. 脑出血与脑梗死

D. 冠心病

E. 主动脉夹层

85. 急性心肌梗死最多见的心律失常是

A. 束支传导阻滞

B. 心房颤动

C. 房性早搏

D. 室性心律失常

E. 房室传导阻滞

86. 发作时心电图 ST 段呈弓背向上抬高的心绞痛是

A. 变异型心绞痛

B. 卧位型心绞痛

C. 劳累性心绞痛

D. 稳定型心绞痛

E. 恶化型心绞痛

87. 十二指肠溃疡发病的主要机制是

A. 细胞更新能力减弱

B. 胃排空延迟

C. 胃酸、胃蛋白酶等侵蚀因素增强

D. 黏膜屏障减弱

E. 黏膜血流量减低

88. 最易发生幽门梗阻的溃疡是

A. 球后溃疡

B. 胃多发溃疡

C. 胃角溃疡

D. 胃窦溃疡

E. 幽门管溃疡

89. 作为胃癌普查时首选的筛选试验是

- A. 钡餐透视
- B. 胃液分析
- C. 胃镜及活检
- D. 粪便隐血实验
- E. Hp 检测

90. 不属肝硬化代偿期表现的是

- A. 脾脏轻度肿大
- B. 肝功能轻度异常
- C. 乏力、食欲减退
- D. 食管胃底静脉曲张
- E. 肝脏质地偏硬

91. 原发性肝癌最常见的形态学类型是

- A. 弥漫型
- B. 结节型
- C. 块状型
- D. 巨块型
- E. 小癌型

92. 慢性肾衰竭各系统表现中最常见的死亡原因是

- A. 消化系统
- B. 神经系统
- C. 心血管系统
- D. 血液系统
- E. 呼吸系统

93. 完全治愈白血病最有效的治疗方法是

- A. 骨髓移植
- B. 营养及药物支持治疗
- C. 化学药物治疗
- D. 免疫治疗
- E. 放射治疗

94. 脾切除治疗特发性血小板减少性紫癜的主要机制是

- A. 降低毛细血管通透性
- B. 降低单核-巨噬细胞系统活性
- C. 减少血小板抗体的产生
- D. 延长血小板寿命
- E. 抑制抗原抗体反应

95. 甲亢患者给以卡比马唑治疗 6 个月, 病情基本控制, 药物减量后进入维持阶段, 维持期时间一般是

- A. 6 个月
- B. 3 个月
- C. 1 个月
- D. 2 个月
- E. 1.5~2.5 年或更长

96. 慢性阻塞性肺疾病最主要的病因是

- A. 感染
- B. 氧化应激
- C. 吸烟
- D. 职业粉尘
- E. 空气污染



97. 特发性血小板减少性紫癜的主要病因为

- A. 免疫因素
- B. 肝脾作用
- C. 感染
- D. 骨髓巨核细胞成熟障碍
- E. 脾功能亢进



98. 甲状腺危象抑制 TH 合成治疗的首选药物为

- A. 普萘洛尔
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 甲硫氧嘧啶
- D. 甲巯咪唑
- E. 卡比马唑



99. 糖尿病并发感染最常见的是

- A. 泌尿系感染
- B. 败血症
- C. 化脓性细菌感染
- D. 寄生虫感染
- E. 胆管感染



100. 下列哪项为再生障碍性贫血的主要发病机制

- A. 免疫功能紊乱
- B. 遗传因素
- C. 造血干细胞缺陷
- D. 缺乏造血原料
- E. 造血微环境缺陷



101. 用铁剂治疗缺铁性贫血, 疗效表现最早的是

- A. 红细胞平均血红蛋白量增多
- B. 红细胞计数增多
- C. 血红蛋白增加
- D. 网织红细胞增加
- E. 红细胞体积增大



102. 雄激素最适合治疗下列哪种贫血

- A. 再生障碍性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 海洋性贫血
- D. 慢性失血性贫血
- E. 铁粒幼细胞贫血



103. X 线钡餐检查诊断消化性溃疡的直接征象是

- A. 充盈缺损

- B. 胃壁蠕动减少呈皮革状
- C. 黏膜呈锯齿状增粗
- D. 有激惹及变形
- E. 龛影

104. 下列关于周围型肺癌的叙述, 正确的是

- A. 纤维支气管镜确诊率高
- B. 约占肺癌的 3 / 4
- C. 以腺癌多见
- D. 生长在段以上的支气管
- E. 位于肺门附近

105. 肺炎链球菌致病力最强的血清型是

- A. 第 9 型
- B. 第 12 型
- C. 第 1 型
- D. 第 2 型
- E. 第 3 型

106. 缓解哮喘症状的首选药物是

- A. 沙丁胺醇
- B. 糖皮质激素
- C. 氨茶碱
- D. 麻黄素
- E. 溴化异丙托品

107. 慢性肺心病的首要死亡原因是

- A. 消化道出血
- B. 肺性脑病
- C. 酸碱失衡
- D. 电解质紊乱
- E. 心律失常

108. 不属甲亢高代谢综合征表现的是

- A. 糖耐量减低
- B. 血胆固醇升高
- C. 怕热、多汗
- D. 多食善饥
- E. 体重锐减

109. 医疗事故争议协商不成的, 当事人自知道或者应当知道其身体健康受到损害之日起多长时间, 可以向卫生行政部门提出医疗事故争议处理申请

- A. 1 个月内
- B. 3 个月内
- C. 6 个月内
- D. 1 年内
- E. 2 年内

110. 具有高等学校医学专业本科以上学历, 需在执业医师指导下在医疗机构中试用期满几年方有资格参加执业医师考试

- A. 6 个月

- B. 1 年
- C. 2 年
- D. 3 年
- E. 5 年

111. 卫生行政法律关系主体违反卫生行政法律规范, 尚未构成犯罪所应承担的法律后果为

- A. 刑罚
- B. 民事责任
- C. 刑事责任
- D. 行政责任
- E. 道德责任

112. 属于乙类传染病, 但采取甲类传染病的预防和控制措施的是

- A. 霍乱
- B. 鼠疫
- C. 艾滋病
- D. 流行性感胃
- E. 人感染高致病性禽流感

113. 下列各项属于护士行为规范的是

- A. 不过度医疗
- B. 不违规签署医学证明文件
- C. 使用适宜诊疗技术和药物
- D. 竭诚协助医生诊治, 密切观察患者病情
- E. 严格遵循临床诊疗规范和技术操作规范

114. 下列情形中, 不属于按劣药论处的是

- A. 超过有效期的药品
- B. 不注明或者更改生产批号的药品
- C. 未标明有效期或者更改有效期的药品
- D. 国务院药品监督管理部门规定禁止使用的药品
- E. 直接接触药品的包装材料和容器未经批准的药品

二、B 型题

(115~116 题共用选项)

- A. 通因通用
- B. 塞因塞用
- C. 寒因寒用
- D. 寒者热之
- E. 热因热用

115. 以上选项中适用于热结旁流的治则是

116. 以上选项中适用于真寒假热的治则是

(117~118 题共用选项)

- A. 肝
- B. 肺
- C. 肾
- D. 脾
- E. 胃

117. 生痰之源为

118. 主水之脏为

(119~120 题共用选项)

- A. 繁衍生命
- B. 护卫肌表
- C. 濡养作用
- D. 充养血脉
- E. 化神作用

119. 精、血、津液共同具有的功能是

120. 气的功能是

(121~122 题共用选项)

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 三焦

121. 主决断的是

122. 主泌别清浊的是

(123~124 题共用选项)

- A. 阴虚则热
- B. 阳虚则寒
- C. 通因通用
- D. 塞因塞用
- E. 寒因寒用

123. “壮水之主，以制阳光”的治法，适用于

124. “益火之源，以消阴翳”的治法，适用于

(125~126 题共用选项)

- A. 既能平肝潜阳，又能重镇降逆
- B. 既能平肝潜阳，又能清肝明目
- C. 既能平肝潜阳，又能软坚散结
- D. 既能平肝潜阳，又能清热解毒
- E. 既能平肝潜阳，又能息风止痉

125. 珍珠母的功效是

126. 代赭石的功效是

(127~128 题共用选项)

- A. 仙鹤草
- B. 白及
- C. 三七
- D. 炮姜
- E. 侧柏叶

127. 具有温经止血功效的药物是

128. 具有凉血止血功效的药物是

(129~130 题共用选项)

- A. 杏仁
- B. 旋覆花

C. 款冬花

D. 紫菀

E. 白芥子

129. 有小毒, 婴儿应慎用的药物是

130. 性辛温, 久咳肺虚及阴虚火旺者忌用的药物是
(131~132 题共用选项)

A. 小茴香

B. 虎杖

C. 肉桂

D. 干姜

E. 吴茱萸

131. 能使因下元虚衰所致上浮的虚阳回归故里的药物是

132. 为治脾肾阳虚, 五更泄泻之常用药的是
(133~134 题共用选项)

A. 久煎

B. 先煎

C. 包煎

D. 溶化

E. 另煎

133. 车前子、旋覆花入汤剂宜

134. 蜂蜜、饴糖入汤剂宜

(135~136 题共用选项)

A. 苦味

B. 咸味

C. 辛味

D. 甘味

E. 酸味

135. 具有发散作用的药物其药味一般是

136. 具有收敛固涩作用的药物其药味一般是
(137~138 题共用选项)

A. 胸痛、气短

B. 右上腹部血管杂音

C. 突发急性腹痛

D. 呕血、黑粪

E. 意识障碍

137. 提示肝癌结节破裂的症状是

138. 提示肝癌伴有上消化道出血的表现是
(139~140 题共用选项)

A. 红细胞管型

B. 脂肪管型

C. 透明管型

D. 蜡样管型

E. 白细胞管型

139. 肾盂肾炎患者尿中常出现的管型是

140. 急性肾炎患者尿中常出现的管型是

(141~142 题共用选项)

- A. 6 个月疗程
- B. 半年~1 年疗程
- C. 3 天疗法
- D. 7 天疗程
- E. 7~14 天疗程

141. 治疗急性膀胱炎目前推荐的疗程是

142. 治疗急性肾盂肾炎的一般疗程是

(143~144 题共用选项)

- A. 急粒白血病
- B. 急淋白血病
- C. 急红白血病
- D. 急单核白血病
- E. 急巨细胞白血病

143. 儿童最多见的急性白血病是

144. 成人患者中急性白血病最多见是

(145~146 题共用选项)

- A. 吡格列酮
- B. 氯磺丙脲
- C. 二甲双胍
- D. 格列本脲
- E. 阿卡波糖

145. 应于进餐时服用的降糖药是

146. 应于餐前半小时服用的降糖药是

(147~148 题共用选项)

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 四级医疗事故
- E. 以上均不是

147. 造成患者明显人身损害的其他后果属于

148. 造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍属于

(149~150 题共用选项)

- A. 医师的社会地位
- B. 医师的执业条件
- C. 医师的职责
- D. 医师的权利
- E. 医师的义务

149. 医师在执业活动中遵守法律规定和技术操作规范体现了

150. 医师在执业活动中, 人格尊严、人身安全不受侵犯体现了