

心血管主治医师考试：《答疑周刊》2019 年第 30 期

问题索引：

【问题】

一、请简述慢性心力衰竭的鉴别诊断。

二、请简述慢性心力衰竭洋地黄中毒的表现及处理。

三、请简述舒张性心力衰竭的治疗。

具体解答：

一、请简述慢性心力衰竭的鉴别诊断。

心力衰竭主要应与以下疾病相鉴别。

1. 支气管哮喘 多见青少年有过敏史；发作时双肺可闻及典型哮鸣音，咳出白色黏痰后呼吸困难常可缓解。血浆 BNP 水平对鉴别心源性和支气管性哮喘有重要参考价值。

2. 肾性水肿 晨起发生，面部水肿，而心源性水肿表现为低垂性，心源性水肿一般不出现颜面水肿。

3. 肝硬化腹腔积液伴下肢水肿 非心源性肝硬化无颈静脉怒张等上腔静脉回流受阻的体征。

二、请简述慢性心力衰竭洋地黄中毒的表现及处理。

洋地黄中毒的表现：洋地黄中毒最重要的反应是各类心律失常，最常见者为室性期前收缩，多表现为二联律，非阵发性交界区心动过速，房性期前收缩，心房颤动及房室传导阻滞。快速房性心律失常又伴有传导阻滞是洋地黄中毒的特征性表现。

洋地黄中毒的处理：发生洋地黄中毒后应立即停药。单发性室性期前收缩、一度房室传导阻滞等停药后常自行消失；对快速性心律失常者，如血钾浓度低则可用静脉补钾，如血钾不低可用利多卡因或苯妥英钠。电复律一般禁用，因易致心室颤动。有传导阻滞及缓慢性心律失常者可用阿托品皮下或静脉注射，一般不需安置临时心脏起搏器。

三、请简述舒张性心力衰竭的治疗。

1. β 受体拮抗剂：改善心肌顺应性使心室容量-压力曲线下移，表明舒张功能改善。

2. 钙通道阻滞剂：降低心肌细胞内钙浓度，改善心肌主动舒张功能，主要用于肥厚型心肌病。

3. ACEI：有效控制高血压，从长远来看改善心肌及小血管重构，有利于改善舒张功能，最适用于高血压心脏病及冠心病。

4. 尽量维持窦性心律，保持房室顺序传导，保证心室舒张期充分的容量。

5. 对肺淤血症状较明显者，可适量应用静脉扩张剂（硝酸盐制剂）或利尿剂降低前负荷，但不宜过度，因过分的减少前负荷可使心排量下降。在无收缩功能障碍的情况下，禁用正性肌力药物。

心血管主治医师考试：《答疑周刊》2019 年第 30 期（word 版下载）

【医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任】

