

【中医内科学】

泄泻的治疗原则是

A. 健脾燥湿

B. 运脾化湿

C. 补脾祛湿

D. 理脾利湿

E. 除湿和胃

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

【医学教育网原创】本题旨在考查考生对泄泻治疗的掌握情况。泄泻的基本病机是脾病湿盛, 故其治疗原则是运脾化湿。运脾概括了初期宜健脾、理脾, 后期宜补脾的具体治法; 化湿包含了温化、寒湿、芳香化湿、清热利湿以及清暑祛湿等方面, 燥湿、祛湿、利湿都可以作为泄泻的具体治疗方法, 而不能作为总治则。因此本题正确答案是 B。

故本题答案选 B。

【传染病学】

有关 HIV 的描述哪项不正确

A. 为 RNA 病毒

B. 有包膜

C. 有两个抗原型 (HIV-I 和 HIV-II)

D. 加热 100℃ 20 分钟不能灭活


E. 为人类免疫缺陷病毒

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

【医学教育网原创】HIV 对热敏感, 对甲醛、紫外线和  $\gamma$  射线不敏感。56℃30 分钟能使 HIV 在体外对人的 T 淋巴细胞失去感染性; 100℃20 分钟能使 HIV 完全灭活; 75%乙醇、0.2% 次氯酸钠、2%戊二醛及 0.1%漂白粉 5~10 分钟能使 HIV 灭活。

故本题答案选 D。



【中医妇科学】

七情内伤导致妇科病, 为害尤甚的为

A. 怒、思、恐



B. 喜、悲、怒



C. 怒、思、悲



D. 忧、恐、惊

E. 悲、恐、惊

学员提问: 为什么选 A?



答案及解析: 本题答案为 A。

【医学教育网原创】七情内伤导致妇科病, 以怒、思、恐为害尤甚。怒, 抑郁忿怒, 使气郁气逆, 可致月经后期、闭经、痛经、不孕、癥瘕; 思, 忧思不解, 每使气结, 发为闭经、月经不调、痛经; 恐, 惊恐伤肾, 每使气下, 可致月经过多、闭经、崩漏、胎动不安、不孕。



故本题答案选 A。

【中医外科学】

附骨疽脓腔较深、脓液不易畅流者宜采用


A. 药线引流



B. 垫棉法

C. 扩创引流

D. 导管引流



E. 以上皆非

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案选 D。

【医学教育网原创】导管引流, 是将导管(或塑胶管或橡皮管)插入疮口中, 引导脓水外流的一种引流方法。适用于附骨疽、流痰、流注等脓腔较深、脓液不易畅流者, 或腹腔手术后。

故本题答案选 D。

### 【中医儿科学】

水痘出疹, 下列哪一项是错误的

- A. 在发热同时或发热 1~2 日后出疹
- B. 皮疹分布以四肢为多, 躯干部少
- C. 在同一部位的皮肤上丘疹、疱疹、结痂同时见到
- D. 出疹顺序先后不一
- E. 疱疹内含清亮液体

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题选 B。

【医学教育网原创】水痘诊断要点

1. 起病 2~3 周前有水痘接触史。

2. 初起有发热、流涕、咳嗽、不思饮食等症, 发热大多不高。在发热同时 1~2 天内即于头、面、发际及全身其他部位出现红色斑丘疹, 以躯干部较多, 四肢部位较少, 疹点出现后很快为疱疹, 大小不等, 内含水液, 周围有红晕, 继而结成痂盖脱落, 不留瘢痕。

3. 皮疹分批出现, 此起彼伏, 在同一时期, 丘疹、疱疹、干痂往往同时并见。

4. 血常规检查及刮取新鲜疱疹基底物检查等可协助诊断。

故本题答案选 B。

医学教育网中医执业助理医师: 《答疑周刊》2019 年第 22 期 (word 版下载)