

**【传染病学】**

霍乱的典型临床表现是

A. 先泻后吐

B. 先吐后泻

C. 只泻不吐

D. 腹泻伴腹痛

E. 吐泻同时发生

**学员提问：**为什么选 A？

**答案及解析：**本题答案为 A。

**【医学教育网原创】**霍乱多以剧烈腹泻开始，病初大便尚有粪质，迅速成为黄色水样便或米泔水样便，无粪臭，每日可达数十次，甚至失禁。一般无发热和腹痛（O139 群除外），无里急后重。呕吐多在腹泻数次后出现，常呈喷射状，呕吐物初为胃内容物，后为水样，严重者亦可为米泔水样，轻者可无呕吐。

故本题答案选 A。

**【中医儿科学】**

以热退疹出为特征的疾病是

A. 麻疹

B. 奶麻

C. 风痧

D. 丹痧

E. 手足口病

**学员提问：**为什么选 B？

**答案及解析：**本题答案为 B。

【医学教育网原创】奶麻，又称假麻，西医学称为幼儿急疹，是由人疱疹病毒 6 型感染而引起的一种急性出疹性传染病，临床以持续高热 3~5 天，热退疹出为特征。好发年龄为 6~18 个月小儿，3 岁以后少见。一年四季都可发病，多见于冬春两季。患病后可获持久免疫力，很少有两次得病者。

故本题答案选 B。

### 【中药学】

牛膝具善下行之性，但此特点不能用于

A. 腰膝酸痛

B. 口舌生疮

C. 气喘咳嗽

D. 难产、胞衣不下

E. 阴虚阳亢眩晕

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

【医学教育网原创】牛膝主治：（1）瘀血阻滞的经闭、痛经、经行腹痛、胞衣不下、跌打伤痛。本品活血祛瘀力较强，性善下行，长于活血通经，为治疗经产病之要药，常与桃仁、红花配伍。

（2）腰膝酸痛，下肢痿软。本品能补肝肾，强筋骨。治肝肾不足，腰膝酸软，常配杜仲、续断等；若痹证日久腰膝酸痛者，常配桑寄生、独活等，如独活寄生汤；本品还可用于治湿热成痿，足膝痿软，多与苍术、黄柏同用。

（3）淋证，水肿，小便不利。本品性善下行，能利水通淋，又能活血祛瘀。治淋证，常配滑石、石韦等；治水肿，常配车前子、泽泻等。

（4）头痛，眩晕，齿痛，口舌生疮，吐血，衄血。本品苦泄下行，能引火（血）下行，以降上亢之阳和上炎之火。治肝阳上亢的眩晕、头痛，常配代赭石、牡蛎等，如镇肝息风汤；治胃火上炎的齿痛、口疮，常配石膏、知母等。

故本题答案选 C。

### 【中医内科学】

下列各项，属着痹特点的是

- A. 疼痛游走不定
- B. 痛势较剧, 痛有定处
- C. 关节酸痛、重着、漫肿
- D. 关节肿胀局限, 见皮下结节
- E. 关节肿胀僵硬, 疼痛不移

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案选 C。

【医学教育网原创】着痹

证候主症: 肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛, 肿胀散漫, 关节活动不利, 肌肤麻木不仁, 舌质淡, 舌苔白腻, 脉濡缓。

故本题答案选 C。

【中医妇科学】

宫颈脱出阴道口, 宫体仍在阴道内, 属于子宫脱垂

- A. I 度轻型
- B. I 度重型
- C. II 度轻型
- D. II 度重型
- E. III 度

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题选 C。

【医学教育网原创】阴挺分度:

I 度轻型: 宫颈外口距处女膜缘 < 4cm, 未达处女膜缘。重型: 宫颈已达处女膜缘, 阴道口可见子宫颈。

II 度轻型: 宫颈脱出阴道口, 宫体仍在阴道内。重型: 部分宫体脱出阴道口。

III 度: 宫颈与宫体全部脱出阴道口外。

故本题答案选 C。

医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2019年第46期 (word版下载)

