

护士执业资格考试《答疑周刊》2020年第8期

1. 【问题】学员提问:请问常见的产程曲线异常有哪些?

【解答】(1) 潜伏期延长: 潜伏期超过 16 小时。

- (2) 活跃期延长:活跃期,超过8小时称活跃期延长。
- (3) 活跃期停滞: 进入活跃期后,宫口不再扩张达2小时以上。
- (4) 第二产程延长: 第二产程初产妇超过2小时,经产妇超过1小时尚未分娩,称第二产程延长。
- (5) 滞产: 指总产程超过24小时。
- 2. 【问题】学员提问: 化验单据、票据、最好用什么消毒方法?

【解答】化验单据、票据、最好用微波消毒灭菌法消毒,考试中可能会出相关题目,比如某某传染病人被收入院,其身上的信件和票据该如何消毒处理,或者是某传染病人所写书信,如何处理后才可寄出。

3. 【问题】学员提问: 18cm 的无菌持物钳浸泡存放,消毒液应放多少?

【解答】9cm。应将无菌持物钳(镊)浸泡在盛有消毒溶液的无菌广口有盖容器内,消毒液液面需浸没轴节以上2~3cm或镊子1/2处。容器底部应垫无菌纱布。

4. 【问题】学员提问: 各类皮试液的浓度?

【解答】青霉素皮试液的标准:每毫升含青霉素 200~500U。

链霉素皮试液的标准:每毫升含链霉素 2500U。

2500U。 www.med66.com

破伤风抗毒素皮试液的标准: 每毫升含破伤风抗毒素 150IU。

细胞色素 C 皮试液的标准: 每毫升含细胞色素 CO. 75mg。

普鲁卡因皮试液的标准:每毫升含 2.5mg。

记忆口诀:青霉皮试二百五,链霉皮试两千五,普鲁卡因二点五,破伤风是一百五,细胞色素点 75。

5. 【问题】各种无菌物品打开后的有效期?

【解答】无菌溶液打开后 24 小时内有效。