

2021 年临床执业医师官方教材变动-女性生殖系统系统

页数	2020 年	2021 年
P330	1.胎盘构成: (2) ③约在受精后 3 周末	约在受精后 15~17 日
331	2) 妊娠 34~36 周	增加: 随妊娠进展, 其分泌量持续增加, 至 39~40 周
332	生殖系统变化 ⑤ 自妊娠 12~14 周起	自妊娠早期开始,增加: 随妊娠进展而逐渐增加, 但子宫 无痛性宫缩称 Braxton Hicks 收缩。
333	3.血压: 在妊娠晚期血压轻度升高	在妊娠 24~26 周后
333	妊娠分期: 2.妊娠临床分期: ①早期妊娠: 从末次月经第一日至孕 13 周末。②孕 14 周~孕 27 周末。 1.停经:	①早期妊娠: 妊娠未到 14 周; ②孕 14 周~孕 27 ⁺⁶ 周; 1.停经 删: 停经 2 个月以上.....更大。
334	辅助检查: 1.妊娠试验: 极少出现假阳性。 (2) B 型超声检查: ③停经 14 周	增加: 6. 其他 部分患者.....等。 辅助检查: 1.妊娠试验: 删: 极少出现假阳性。 增加: 但要确定是否为宫内妊娠, 尚需要超声检查。 (2) B 型超声检查: ③妊娠 11~13 ⁺⁶ 周。

		2.胎动: 随妊娠进展逐渐增强, 至妊娠 32~34 周大高峰, 38 周后逐渐减少。
335	二、产前检查: (一) 产前检查	增加: (一) 产前检查的时间、次数及孕周: 内容调整。 (二) 产前检查的内容: 应详细.....健康教育指导。
336	(3) 阴道检查: 妊娠至 24 周左右.....对角径。 (4) 肛门检查: 可以了解.....矢状径。	(3) 分娩前或产时阴道检查.....开大程度。 删除 (4) 肛门检查。
337	(一) 1. 高危儿: ③巨大儿($\geq 4000\text{g}$) ④评分 ≤ 4 分 3、妊娠早期: ④9~13 ⁺⁶ 周 4、妊娠晚期: (2) 胎动监护: 胎动计数 ≥ 10 次/2H 为正常。 1) 监测胎心率:	③小于孕龄儿或大于孕龄儿。 ④评分 0~3 分; 3、妊娠早期: ④11~13 ⁺⁶ 周 4、妊娠晚期: (2) 胎动监护: 增加: 胎动.....胎动计数 新增: ②基线变异:6~25 次/min。
349	二、早产: 体重为 1000~2499g。 1、自发性早产: ①②	删除: 体重为 1000~2499g。 1、自发性早产: 增加: (1) 胎膜完整早产: 是最常见的类型, 约占 45%。 ①删除。
352	1. 诊断 1); 2)	1. 诊断: 删除: 2) 孕酮: 多数在 10~25ng/ml 之间.....妊娠。
353	五、治疗: (1) 保守治疗: 术后 2 周血 HCG $<10\%$ 。	五、治疗: (1) 保守治疗: 术后 12 日血 HCG 未下降至

		术前的 10%以下。 删: (3) 输卵管手术.....
358	低置胎盘	增加: 4.低置胎盘:2cm。
359	胎盘早剥: (四) 临床表现: 分 3 度	胎盘早剥: (四) 临床表现: 分 4 级, 增加 0 级: 分娩..... 诊断。
362	2.慢性胎儿窘迫: (3) 评分 4~6 分 提示2~4 分 提示.....。 2、慢性胎儿窘迫 (3) 终止妊娠: 胎儿生物物理评分<4 分	(3) 评分 5~6 分提示..... ≤ 4 分提示.....。 2、慢性胎儿窘迫 (3) 终止妊娠: 胎儿生物物理评分≤4 分。
367	5.结束妊娠: (3) 分娩过程中的胰岛素控制 1) 阴道分娩: ①血糖>5.6...②...2u/h。	删除: ①②。
369	(2) 不协调性宫缩乏力的处理: 2) 镇静: 吗啡 10~15mg 肌内注射或地西洋.....	吗啡 10mg 肌内注射 删除: 或地西洋.....静脉推注。

〔医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任〕