

临床助理医师考试: 《答疑周刊》2021 年第 28 期

【儿科系统疾病】

1. 女婴, 早产儿, 生后 3 天, 出现反应低下, 不吃, 不哭, 不动, 体温不升, 皮肤黏膜斑点皮肤呈大理石花纹。考虑最可能的是

- A. 新生儿寒冷损伤综合症
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿溶血病
- D. 新生儿缺氧缺血性脑病
- E. 生理性黄疸

【正确答案】 B

【答案解析】 一般表现(非特异表现) 早期症状、体征常不典型。多数患儿表现为反应差, 精神较萎靡, 吃奶减少或不吃, 体温低或体温波动, 病理性黄疸, 呼吸急促、暂停、呼气性呻吟, 综合考虑患儿败血症的可能性较大。

2. 重度新生儿缺氧缺血性脑病症状最明显的时间是

- A. 初生至 6 小时
- B. 初生至 12 小时
- C. 初生至 24 小时
- D. 初生至 48 小时
- E. 初生至 72 小时

【正确答案】 E

【答案解析】 HIE 临床症状和体征取决于窒息缺氧事件的严重性和持续时间, 神经系统症状一般于生后 6~12 小时出现, 逐渐加重, 至 72 小时达高峰, 随后逐渐好转。严重者多在 72 小时内恶化或死亡。

3. 以下哪项不属于新生儿常见的几种特殊生理状态

- A. 假月经
- B. 产瘤
- C. 生理性黄疸
- D. 马牙或板牙
- E. 乳腺肿大

【正确答案】 B

【答案解析】 新生儿常见的几种特殊生理状态：①生理性黄疸；②“马牙”或“板牙”；③乳腺肿大；④假月经。

4. 新生儿生理性黄疸的特点是

- A. 可发生于足月儿
- B. 生后即出现黄疸
- C. 6 周后黄疸消退
- D. 一般情况差
- E. 血清胆红素超过 19mg/dl

【正确答案】 A

【答案解析】 生理性黄疸多在生后 2~3 天出现，第 4~6 天达高峰，血清总胆红素(TSB)足月儿不超过  $204 \mu\text{mol/L}$  (12mg/dl)，结合胆红素不超过  $25 \mu\text{mol/L}$  (1.5mg/dl)，足月儿在生后 2 周消退。