


医学教育网执业西药师：《答疑周刊》2021 年第 26 期

问题索引：

1. 【问题】药品不良反应评价指标。 
2. 【问题】部分药品服用的适宜时间，考点汇总。

具体解答：

1. 【问题】药品不良反应评价指标。 

结果	评价标准
肯定	用药及 ADR 发生时间顺序合理；停药后 ADR 迅速减轻或好转甚至停止；再用药，反应再现，并可能加重；有文献资料佐证；排除其他因素（如原患疾病）[医学教育网原创]影响
很可能	没有重复用药史，其他的条件与“肯定”相同，或有合并用药，但可排除合并用药导致 ADR 发生的[医学教育网原创]可能性
可能	用药与反应发生时间关系密切，同时有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外
可能无关	ADR 与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现
待评价	报告内容填写不齐全，等待补充后再评价，或因果关系难以定论，缺乏文献资料佐证[医学教育网原创]
无法评价	报表缺项太多，因果关系难以定论，资料又无法补充

2. 【问题】部分药品服用的适宜时间，考点汇总。

适宜时间	药品种类
清晨	糖皮质激素、抗高血压药、抗抑郁药、利尿剂、盐类泻药（硫酸镁）[医学教育网原创]
餐前	胃黏膜保护剂、收敛药（鞣酸蛋白）、促胃动力药、降糖药（多数降糖药）、钙磷调节药、抗菌药物、广谱抗线虫药
餐中	降糖药（二甲双胍、阿卡波糖、格列美脲）、助消化药（胰酶、

	淀粉酶)、非甾体类抗炎药 (舒林酸、吡罗昔康、伊索昔康、美洛昔康、奥沙普嗪)、肝胆辅助用药、抗血小板药 (噻氯匹定)、减肥药、分子靶向抗肿瘤药、抗结核药 (乙胺丁醇、对氨基水杨酸)
餐后	多数非甾体类抗炎药 (阿司匹林、贝诺酯、对乙酰氨基酚、吲哚美辛、[医学教育网原创]尼美舒利、布洛芬、双氯芬酸)、维生素、组胺 H ₂ 受体阻断剂
睡前	催眠药、平喘药、调节血脂药、抗过敏药、钙剂、缓泻药、组胺 H ₂ 受体阻断剂 ((西咪替丁) 抑制夜间的基础胃酸分泌)

