

医学教育网执业西药师：《答疑周刊》2021 年第 31 期

问题索引：

1. 【问题】哮喘的治疗药物。
2. 【问题】三种治疗尿失禁的药物。
3. 【问题】中毒的一般处理。

具体解答：

1. 【问题】哮喘的治疗药物。

【解答】[医学教育网原创]

控制性药物（抗炎的） —需要每天使用长期维持—	吸入糖皮质激素（ICS）
	全身性糖皮质激素（口服）
	白三烯受体阻断剂（LTRA）
	长效—— β_2 受体激动剂（LABA） 缓释茶碱、色甘酸钠、抗 IgE 单克隆抗体
缓解性药物（扩管的） —又称急救药物，按需使用—	短效—— β_2 受体激动剂（SABA）
	全身性糖皮质激素（口服）
	吸入型——抗胆碱类（“托”“溴铵”） 短效——茶碱类

2. 【问题】治疗尿失禁的药物。

【解答】

压力性尿失禁 “打喷嚏/大笑尿裤子”	选择性 α_1 受体激动剂 ——米多君	让尿道变紧
急迫性尿失禁 “憋不住尿”	抗胆碱能药（ M_2 、 M_3 阻断剂） ——奥昔布宁 索利那新 托特罗定 “索性开上奥托上厕所”	让膀胱松弛
充盈性尿失禁 “尿存满了，被挤出来”	选择性 α_1 受体阻断剂 ——多沙唑嗪、阿夫唑嗪、特拉唑嗪 高选择性 α_{1A} 受体阻断剂 ——坦索罗辛 [医学教育网原创]	让尿道松弛

3. 【问题】中毒的一般处理。

【解答】[医学教育网原创]

