

2021 年《药学综合知识与技能》考前密卷（一）

一、最佳选择题

1. 配置 10%葡萄糖注射液 500ml，现用 50%和 5%的葡萄糖注射液混合，需要

A. 50%葡萄糖注射液 56ml 和 5%葡萄糖注射液 444ml

B. 50%葡萄糖注射液 72ml 和 5%葡萄糖注射液 428ml

C. 50%葡萄糖注射液 85ml 和 5%葡萄糖注射液 415ml

D. 50%葡萄糖注射液 94ml 和 5%葡萄糖注射液 406ml

E. 50%葡萄糖注射液 106ml 和 5%葡萄糖注射液 394ml

2. 下列药物信息资源中，归属一级文献资料的是

A. 新编药理学

B. 中国药学杂志

C. 中国药学文摘

D. 中国药学年鉴

E. 中国药典临床用药须知

3. 下列药品中，不宜选用氯化钠注射液溶解的是

A. 氟罗沙星

B. 头孢菌素

C. 苯妥英钠

D. 瑞替普酶

E. 阿昔洛韦

4. “每日用药”的是外文缩写

A. qh.

B. qs.

C. qod.

D. qd.

E. qn.

5. 可判定为“不规范处方”的情况是

A. 未使用药品规范名称

B. 重复给药

C. 有配伍禁忌

D. 用法、用量或联合用药不适宜

E. 无正当理由不首选国家基本药物

6. 影响药品质量的环境因素不包括

A. 空气

B. 日光

C. 库房温度

D. 包装车间湿度

E. 药品包装材料

7. 关于无正当理由超说明书用药的说法，错误的是

A. 超说明书用药的目的只能是为了患者的利益

- B. 超说明书用药必须权衡利弊，保障患者利益最大化
- C. 超说明书用药必须有充分的文献报道、循证医学研究结果等证据支持
- D. 超说明书用药主要以试验、研究为目的而使用
- E. 超说明书用药必须充分考虑药物不良反应、禁忌证、注意事项等，权衡患者获得的利益和可能带来的风险

8. 属于餐中服用的降糖药是

- A. 格列本脲
- B. 罗格列酮
- C. 格列齐特
- D. 格列吡嗪
- E. 二甲双胍

9. 抽烟可降低呋塞米的利尿作用，其主要原因是烟草中含有

- A. 醛类成分
- B. 烟碱
- C. 焦油
- D. 咖啡因
- E. 氢氰酸

10. 老年人在用药期间，一旦出现药源性疾病，最简单、有效的干预措施是

- A. 增加药物剂量

- B. 减少药物剂量
- C. 暂停用药
- D. 改变给药途径
- E. 调整用药时间

11. 分娩前应用氯霉素可引起新生儿

- A. 腹泻
- B. 核黄疸
- C. 灰婴综合征
- D. 肺炎
- E. 呼吸窘迫综合症

12. 患者，男，60 岁，体重 55kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查，ALT 20IU/L，血肌酐(Cr)1.8mg/dl，痰培养为铜绿假单胞菌，临床选用头孢他啶。成年男性的肌酐清除率计算公式为 $Cl_{cr} = (140 - \text{年龄}) \times \text{体重} / (72 \times Cr)$ ，成年女性的肌酐清除率为男性的 0.85。该患者的肌酐清除率约是

- A. 26.55mg/dl
- B. 30.58mg/dl
- C. 33.95mg/dl
- D. 35.45mg/dl
- E. 38.65mg/dl

13. 患者因中耳炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，再次使用该药物后，皮疹再次出现，排除其他疾病可能，该病例用药与不良反应因果关系评价结果是

- A. 肯定
- B. 很可能
- C. 可能
- D. 可能无关
- E. 无法评价

14. 因产生肾血管痉挛而致急性肾衰竭的、少尿或无尿的药物是

- A. 布洛芬
- B. 吲哚美辛
- C. 去甲肾上腺素
- D. 阿司匹林
- E. 顺铂

15. 丙氨酸氨基转移酶（ALT）活力与肝细胞受损程度的关系是

- A. 呈正比关系
- B. 呈反比关系
- C. 不呈比例
- D. 关联性不大
- E. 无关联性

16. 关于非手术治疗患者抗菌药物的预防性应用原则，以下叙述错误的是

- A. 预防用药适应证和抗菌药物选择应基于循证医学证据
- B. 不宜盲目选用广谱抗菌药或多药联合预防多种细菌的多部位感染
- C. 针对任何时间可能发生的感染
- D. 麻疹、水痘等病毒性疾病原则上不应预防使用抗菌药物
- E. 用于尚无细菌性感染征象但暴露于致病菌感染环境的高危人群

17. 以下药物中可导致血尿酸增高的不包括

- A. 阿司匹林
- B. 氢氯噻嗪
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 异烟肼

18. 血红蛋白的正常值参考范围是

- A. 男性 100~150g / L，女性 90~150g / L
- B. 男性 100~160g / L，女性 90~150g / L
- C. 男性 120~160g / L，女性 110~150g / L
- D. 男性 110~150g / L，新生儿 170~200g / L
- E. 男性 120~160g / L，新生儿 170~190g / L

19. 在考虑患者主观满意程度的基础上，比较不同治疗方案的经济合理性，应选用的药物经济学研究方法是

- A. 成本效益分析
- B. 成本效果分析
- C. 成本效用分析
- D. 最小成本分析
- E. 最大效益分析

20. 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是

- A. 硫酸镁
- B. 甘油栓
- C. 乳果糖
- D. 番泻叶、大黄
- E. 比沙可啶

21. 应用解热镇痛药退热时，两次给药的时间间隔为

- A. 2~4 小时
- B. 3~5 小时
- C. 4~6 小时
- D. 5~7 小时
- E. 6~8 小时

22. 患者，男，19 岁，近日因双眼干涩、视物不爽、眼睛发红来院就诊，诊断为干眼症，以下说法错误的是

- A. 患者可选用羟甲基纤维素钠滴眼液治疗干眼症
- B. 药物治疗 3 天后，症状仍未缓解者，需更换其他药物
- C. 患者应避免坐在正对着冷气流或热气流的地方
- D. 避免吸烟并远离充满烟雾的空气
- E. 在阅读或使用电脑时尝试经常眨眼，外出时使用护目镜

23. 患者，男，30 岁，急性链球菌感染，青霉素皮试阴性，有关其抗菌药物使用叙述错误的是

- A. 青霉素 V 钾，250mg qid po，疗程 10 天
- B. 阿莫西林，500mg bid po，疗程 10 天
- C. 头孢氨苄，500mg bid po，疗程 5~7 天
- D. 苄星青霉素，120 万单位静脉注射，1 次用药
- E. 青霉素 V 钾，500mg bid po 疗程 10 天

24. 对口腔黏膜有麻醉作用，产生麻木感，需整片吞服，不可咀嚼的镇咳药是

- A. 右美沙芬
- B. 色甘酸钠
- C. 苯丙哌林
- D. 可待因
- E. 羧甲司坦

25. 奥司他韦最受关注的不良反应是

- A. 消化系统损害
- B. 神经精神紊乱
- C. 全身性损害
- D. 外周神经系统损害
- E. 皮肤及其附件损害

26. 服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

- A. 睡前
- B. 餐中
- C. 餐后 1 小时
- D. 餐前 0.5 小时
- E. 餐前 10~20 分钟

27. 具有球后视神经炎不良反应的药物是

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 链霉素
- D. 乙胺丁醇
- E. 吡嗪酰胺

28. 患者，男，80 岁，因发热、咳嗽、咳痰 2 天就诊，诊断为社区获得性肺炎，该患者推荐使用的抗菌药物是

- A. 多西环素
- B. 米诺环素
- C. 红霉素
- D. 克拉霉素
- E. 左氧氟沙星

29. 患者，女，58 岁，有 2 型糖尿病史，因头疼、头晕就诊，体征和实验室检查，餐前血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 8.8%，血压 166/96mmHg，蛋白尿 >1g/24h，推荐在降糖的基础上，合并选用

- A. 特拉唑嗪
- B. 氢氯噻嗪
- C. 二甲双胍
- D. 赖诺普利
- E. 氯吡格雷

30. 以下抗高血压药物中，属于利尿药的是

- A. 缬沙坦
- B. 氨氯地平
- C. 维拉帕米
- D. 氯噻酮
- E. 依那普利

31. 患者，男，55 岁，因心绞痛伴房颤，给予地尔硫（卅卓）治疗，地尔硫（卅卓）的禁忌证是

- A. 双侧肾动脉狭窄
- B. 高度房室传导阻断
- C. 痛风
- D. 冠心病
- E. 明显支气管痉挛

32. 伴有明显左心室肥大的房颤患者，维持窦律的首选药物是

- A. 美托洛尔
- B. 地高辛
- C. 胺碘酮
- D. 普罗帕酮
- E. 多非利特

33. β -受体阻断剂用于抗心衰治疗的给药方法，错误的是

- A. 小剂量开始，每隔 2~4 周可剂量加倍
- B. 目标剂量是：静息心率降至 60 次/分左右
- C. 若心率不达标，则应用至最大耐受量
- D. 所有心衰患者均应使用，急性心衰早期使用
- E. 严重心动过缓、低血压者禁用

34. 患者，男，68 岁，哮喘病史 10 年，心力衰竭病史 1 年，近日心率持续出现 >70 次/分，推荐使用的减慢心率的药物是

- A. 螺内酯
- B. 卡维地洛
- C. 雷米普利
- D. 沙库巴曲缬沙坦
- E. 伊伐布雷定

35. 控制癫痫持续状态应首选

- A. 肌肉注射地西洋
- B. 静脉注射地西洋
- C. 静脉注射丙戊酸钠
- D. 口服硫酸镁
- E. 静脉注射硫酸镁

36. 患者，男，65 岁，近一个月出现入睡困难，睡眠维持困难，白天有头昏，疲倦等不适感，尝试非药物治疗无改善，首选推荐的药物治疗方案是

- A. 佐匹克隆 7.5mg po qn
- B. 苯巴比妥 100mg po qn
- C. 地西洋 5mg po qn
- D. 氯硝西洋 2mg po qn
- E. 艾司唑仑 1mg po qn

37. 由大肠埃希菌引起的急性胆囊炎患者，可首选的抗菌治疗药物是

- A. 头孢他啶+克拉霉素
- B. 头孢他啶+甲硝唑
- C. 阿莫西林+克拉霉素
- D. 头孢唑林+甲硝唑
- E. 甲硝唑+克拉霉素

38. 以下口服降糖药，在单独使用时，一般不导致低血糖的是

- A. 格列本脲
- B. 那格列奈
- C. 罗格列酮
- D. 瑞格列奈
- E. 格列美脲

39. 治疗良性前列腺增生症，常用联合治疗方案不包括

- A. 多沙唑嗪与度他雄胺合用
- B. 奥昔布宁与度他雄胺合用
- C. 特拉唑嗪和非那雄胺合用
- D. 索利那新和多沙唑嗪合用
- E. 坦索罗辛与依立雄胺合用

40. 氟马西尼用于解救

- A. 异烟肼中毒

- B. 吗啡中毒
- C. 三环类抗抑郁药中毒
- D. 巴比妥类镇静催眠药中毒
- E. 苯二氮（卅卓）类镇静催眠药中毒

二、配伍选择题

1. （处方中常见的外文缩写）

- A. 右眼
- B. 左眼
- C. 双眼
- D. 生理盐水
- E. 水剂

- 1) OD.
- 2) Aq.

2. A. $-5^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

B. $2^{\circ}\text{C} \sim 4^{\circ}\text{C}$

C. $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

D. $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$

E. $20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

1) “冷处”所指温度范围是

2) “室温”所指温度范围是

3. (儿童用药特点)

A. 皮下注射

B. 静脉给药

C. 口服给药

D. 局部给药

E. 肌肉注射

1) 针对儿童，最方便、最安全、最经济的给药途径

2) 儿童病情危重抢救时，多采用

4. A. 锥体外系反应

B. 癫痫发作

C. 听神经障碍

D. 再生障碍性贫血

E. 血小板减少

1) 哌甲酯可引起

2) 氯霉素可引起

3) 庆大霉素可引起

4) 左旋多巴可引起

5. (急性结膜炎的药物治疗)

A. 0.1%羟苄唑滴眼液

B. 0.1%酞丁安滴眼液

C. 碘苷滴眼剂

D. 妥布霉素滴眼剂

E. 色甘酸钠滴眼剂

1) 春季卡他性结膜炎可应用

2) 流行性出血性结膜炎可应用

6. (血压水平分类)

A. 收缩压 ≥ 140 mmHg, 舒张压 < 90 mmHg

B. 收缩压 ≥ 180 mmHg, 舒张压 ≥ 110 mmHg

C. 收缩压 120~139mmHg, 舒张压 80~89mmHg

D. 收缩压 140~159mmHg, 舒张压 90~99mmHg

E. 收缩压 160~179mmHg, 舒张压 100~109mmHg

1) 单纯收缩期高血压水平范围是

2) 2 级高血压(中度)血压水平范围是

3) 正常高值的范围

7. (药物适宜的服用时间)

A. 早餐前 0.5 ~ 1 小时

B. 餐前 15 ~30 分钟

C. 饭后 1.5 小时

D. 睡前顿服

E. 早餐后 0.5 ~ 1 小时

1) 患者,男,65岁,胃食管反流病病史2年,服用奥美拉唑肠溶片 20mg qd 强化抑酸治疗,适宜的服用时间是

2) 患者,女,58岁,胃食管反流病病史5年,近日因服用兰索拉唑效果不佳,医师处方联合应用多潘立酮,多潘立酮适宜的服用时间是

8. A. 艾司唑仑

B. 丁螺环酮

C. 阿米替林

D. 舍曲林

E. 度洛西汀

1) 5-HT_{1A}受体部分激动剂

2) 苯二氮(卅卓)类药物

3) 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

4) 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂

9. (深静脉血栓形成 DVT 的慢性期治疗)

A. 华法林

B. 利伐沙班

C. 达比加群酯

D. 低分子肝素

E. 阿司匹林

1) 对于深静脉血栓形成的慢性期治疗,目前临床采用的标准药物是

2) 伴肿瘤的下肢 DVT 或 PE 患者,推荐前3个月应用

10. A. 压力性尿失禁

B. 急迫性尿失禁

C. 充盈性尿失禁

D. 真性尿失禁

E. 急性、可逆性/暂时性尿失禁

1) 老年女性，尤其是肥胖或经产妇常见的尿失禁类型是

2) 老年男性多见，常见原因是良性前列腺增生、前列腺癌和尿道狭窄

11. A. NRTIs

B. NNRTIs

C. PIs

D. FIs

E. CCR5

1) 核苷酸类逆转录酶抑制剂

2) 非核苷酸类逆转录酶抑制剂

3) 蛋白酶抑制剂

4) 融合抑制剂

12. (毒物及药物中毒解救)

A. 水银中毒

B. 吗啡中毒

C. 有机磷中毒

D. 氰化物中毒

E. 硫酸铜中毒

1) 二巯丙醇用于解救

2) 烯丙吗啡用于解救

13. A. 青霉素

B. 两性霉素 B

C. 维生素 K

D. 盐酸万古霉素

E. 硫酸庆大霉素

1) 在配制静脉输液时，不宜用葡萄糖注射液溶解的药品是

2) 在配制静脉输液时，不宜用氯化钠注射液溶解的药品是

14. A. 具有蛋白同化作用的药物

B. 精神刺激剂

C. 利尿剂

D. β -受体阻断剂

E. 肽激素类

1) 导致肝功能和心脏功能障碍，并将引起糖尿病

2) 易造成人体严重脱水、肾衰竭

3) 会引起头晕、心动过缓、低血压，严重者可诱发支气管哮喘

4) 用量大时，会出现中毒症状，呼吸快而浅，血压上升等，严重时

因呼吸麻痹而死亡

15. A. 一般无须调整剂量

B. 须谨慎使用，必要时减量给药

C. 尽可能避免使用

D. 需增加给药剂量

E. 需在增加剂量的同时给予其他药物防治可能的不良反应

1) 主要经肝脏清除，肝功能减退时清除明显减少，但并无明显毒性反应发生的药物

2) 经肝或相当药量经肝清除，肝功能减退时其清除或代谢物形成减少，可致明显毒性反应的药物在有肝病时

3) 经肾排泄的药物，在肝功能障碍时

16. A. 格列喹酮

B. 地西洋

C. 诺氟沙星

D. 阿莫西林

E. 华法林

1) 老年人因总体液及非脂肪组织逐渐减少，用药后分布容积增大，从体内消除缓慢，药物作用更持久的药物是

2) 能分泌至乳汁中，引起新生儿黄疸，哺乳期妇女不宜应用的药物是

17. A. 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等
- B. 肾移植术后发生排斥反应
- C. 胃溃疡
- D. 糖尿病
- E. 急性、化脓性感染，包括局部感染和全身感染
- 1) 可主要引起嗜碱性粒细胞增多的疾病为
 - 2) 可主要引起嗜酸性粒细胞增多的疾病为
 - 3) 可主要引起淋巴细胞增多的疾病为
 - 4) 可引起血红蛋白减少的疾病为

18. A. 多索茶碱注射液

- B. 布地奈德混悬液
- C. 孟鲁司特钠咀嚼片
- D. 沙丁胺醇气雾剂

E. 异丙托溴铵气雾剂

患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年，近日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎治疗。

- 1) 该患者应慎用的药物是
- 2) 应告知该患者用药后需漱口的药物是

19. [肠易激综合征（IBS）的治疗药物]

A. 5-HT₃受体阻断剂

B. 抗菌药物

C. 肠道促分泌剂

D. 阿片类受体配体药

E. 解痉药

1) 奥替溴铵可有效缓解 IBS 患者腹痛及总体症状，属于

2) 利那洛肽可显著增加便秘型 IBS 患者自主排便频率、缓解腹痛症状，属于

三、综合分析选择题

1. 美国食品药品监督管理局（FDA）根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

1) 以下药物中，属于妊娠危险性 A 级药物的是

A. 雌二醇

B. 氟康唑

C. 米非司酮

D. 氢甲睾素

E. 枸橼酸钾

2) 下列药物中，属于妊娠危险性 B 级药物的是

- A. 红霉素
- B. 氯化钾
- C. 三唑仑
- D. 奥美拉唑
- E. 复合维生素 B

3) 以下药物中，属于妊娠危险性 D 级药物的是

- A. 青霉素
- B. 链霉素
- C. 氯霉素
- D. 克林霉素
- E. 红霉素

4) 下述药物中，属于妊娠危险性 X 级药物的是

- A. 青霉素
- B. 胰岛素
- C. 维生素 C
- D. 炔诺酮
- E. 二甲双胍

2. 男性，28 岁，电脑工程师，因连日加班自觉眼涩、眼干、眼胀、异物感来药店买眼药水。

1) 患者适用的药品是

- A. 左氧氟沙星滴眼液
- B. 后马托品滴眼液
- C. 氯霉素滴眼液
- D. 玻璃酸钠滴眼液
- E. 七叶洋地黄双苷滴眼液

2) 应提示患者的用药注意事项，错误的是

- A. 若伴有结膜充血、脓性分泌物应及时就医
- B. 用药期间暂停配戴角膜接触镜
- C. 每天用药 4 次，滴眼后闭目三分钟
- D. 频繁用眼时可多眨眼，适当闭目休息
- E. 应向患者推荐含抑菌剂的品种，因其不易污染细菌

3. 患者，女，75 岁，实施右侧髋关节置换术，术后一周，患侧下肢出现肿胀、疼痛，体检患肢呈可凹性水肿，诊断为深静脉血栓。

1) 该患者应选用的药物是

- A. 阿司匹林

- B. 血凝酶
- C. 氯吡格雷
- D. 低分子肝素
- E. 替格瑞洛

2) 以上治疗药物的给药途径宜是

- A. 皮下注射
- B. 肌内注射
- C. 口服
- D. 皮内注射
- E. 舌下

4. 患者，女，50岁。一年前临床诊断为室上性心动过速，服用美托洛尔片 25mg bid，近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡，幽门螺杆菌阳性，医师处方：奥美拉唑肠溶胶囊 20mg bid，阿莫西林胶囊 100mg bid，克拉霉素片 500mg bid，枸橼酸铋钾胶囊 220mg bid。

1) 该处方中，给药剂量错误的药物是

- A. 奥美拉唑肠溶胶囊
- B. 克拉霉素片
- C. 阿莫西林胶囊
- D. 枸橼酸铋钾胶囊

E. 美托洛尔片

2) 关于四联疗法中药物的服用时间，以下正确的是

- A. 阿莫西林餐后即可服用
- B. 奥美拉唑肠溶胶囊餐后半小时服用
- C. 克拉霉素片餐前半小时服用
- D. 枸橼酸铋钾胶囊餐前即可服用
- E. 四联疗法中药物均应空腹服用

3) 幽门螺杆菌根除治疗方案实施后，应常规评估其是否根除。常采用尿素呼气试验检测，关于该检测方法对于停药时间的要求，以下正确的是

- A. 奥美拉唑肠溶胶囊至少停药 4 周
- B. 克拉霉素片至少停药 2 周
- C. 阿莫西林胶囊至少停药 4 周
- D. 枸橼酸铋钾胶囊至少停药 2 周
- E. 四联疗法中药物均应停药 4 周

5. 患者，男，33 岁。主诉：口腔反复溃疡 8 年，近 4 天溃疡复发，舌尖小溃疡，灼痛明显，影响说话、进食，口内唾液黏稠。

诊断：复发性口腔溃疡（轻型）；

治疗：局部使用冰硼咽喉散，吹敷患处，一日 2~3 次；

补充维生素，一日 3 次。

1) 若需要抗炎药物，减少炎症的渗出，患者可以使用

A. 甲硝唑含漱液

B. 地塞米松粘贴片

C. 维生素 C

D. 0.5%甲硝唑含漱液

E. 西地碘含片

2) 口服维生素可维持正常的代谢功能，促进病损愈合，患者补充的是下列哪种维生素

A. 维生素 A 和维生素 C

B. 维生素 B 和维生素 E

C. 维生素 K 和维生素 E

D. 维生素 B 和维生素 C

E. 维生素 A 和维生素 D

6. 患者，女，55 岁，是个搬运工，搬运物体时经常发生胸骨后压榨样疼痛，持续数分钟，搬运休息后缓解，有时左肩背部也有疼痛。诊断为稳定型心绞痛。

1) 患者发作时可使用的药物是

- A. 硝酸甘油
- B. 阿司匹林
- C. 卡托普利
- D. 辛伐他汀
- E. 美托洛尔

2) 患者首次服用上述药物，药师应提醒患者可能发生

- A. 干咳
- B. 胃肠道反应
- C. 直立性低血压
- D. 肌损伤
- E. 支气管哮喘

3) 患者服用上述药物的剂量是

- A. 5~10mg
- B. 5mg
- C. 0.25~0.5mg
- D. 75~150mg
- E. 300mg

7. 患者，男，68 岁，青光眼病史 3 年，近日因间断腹泻、排黏液稀糊样便，伴有腹痛就诊，临床诊断为肠易激综合征。

1) 患者可使用的治疗药物是

A. 匹维溴铵

B. 曲美布汀

C. 阿托品

D. 东莨菪碱

E. 山莨菪碱

2) 关于以上治疗药物的服用方式，叙述正确的是

A. 宜在进餐时用水整片吞服，不宜睡前吞服

B. 将该药倒入 50ml 温水中充分稀释，摇匀服用

C. 适宜餐后 1 小时服用

D. 可用水调成糊状、丸状服用

E. 应嚼碎服用，餐前 1 小时及睡前服用

8. 患者，女，67 岁，有高血压病史，右手抖动，行走缓慢 4 年，诊断为帕金森病。服用复方左旋多巴治疗，症状一度好转又反复加重，随后采用加大复方左旋多巴剂量，并加用苯海索。患者同时服用氨氯地平、卡托普利等药物控制血压。

1) 患者近日出现运动症状波动，伴有异动症。导致该不良反应的药物是

- A. 左旋多巴
- B. 苄丝肼
- C. 苯海索
- D. 氨氯地平
- E. 卡托普利

2) 复方左旋多巴适宜的服用时间是

- A. 下午 4 点前
- B. 早晨服用
- C. 睡前服用
- D. 餐前 1 小时
- E. 餐中

四、多项选择题

1. 药物信息的二级信息包括

- A. 《药典》
- B. 《新编药理学》
- C. 《药品不良反应》
- D. 《医学索引》

E. 《医学文摘》

2. 以下叙述中，处方审核结果可判为不规范处方的是

- A. 重复用药
- B. 字迹难以辨认
- C. 中药饮片未单独开具处方
- D. 无特殊情况门诊处方超过 7 日用量
- E. 剂量、规格、数量、单位等书写不清楚

3. 不宜与苯巴比妥同服用的中成药是

- A. 散痰宁糖浆
- B. 蛇胆川贝液
- C. 虎骨酒
- D. 舒筋活络酒
- E. 天一止咳糖浆

4. 基于新生儿体内药物分布特点而容易导致的不良反应是

- A. 皮炎激素软膏引起全身水肿
- B. 苯巴比妥中毒
- C. 脂溶性药物中毒
- D. 磺胺类导致核黄疸
- E. 新生霉素致高胆红素血症

5. 提高病人用药依从性的措施包括

- A. 针对不同患者人群，制定个体化治疗方案
- B. 简化治疗方案
- C. 扩大药品适应证
- D. 使用通俗、简洁的言语向患者介绍
- E. 对于记忆力差的老年患者可使用分时药盒
6. 在乙型肝炎血清学检查中，“大三阳”是指
- A. 乙型肝炎病毒 e 抗原阳性
- B. 乙型肝炎病毒 e 抗体阳性
- C. 乙型肝炎病毒表面抗原阳性
- D. 乙型肝炎病毒表面抗体阳性
- E. 乙型肝炎病毒核心抗体阳性
7. 以下可用于治疗昆虫叮咬的药物包括
- A. 紫云膏
- B. 泼尼松
- C. 氯苯那敏
- D. 西替利嗪
- E. 炉甘石洗剂
8. 预防接种肺炎链球菌疫苗可减少特定人群罹患肺炎的风险。我国已上市 23 价肺炎链球菌多糖疫苗（PPV23），可有效预防侵袭性肺炎链球菌的感染。以下属于该疫苗建议接种人群的是

- A. 年龄 ≥ 65 岁
- B. 年龄 < 65 岁，伴有慢性肺部疾病
- C. 长期居住养老院
- D. 吸烟者
- E. 酗酒者
9. 可作为华法林替代治疗药物的是
- A. 阿司匹林
- B. 氯吡格雷
- C. 达比加群酯
- D. 利伐沙班
- E. 阿哌沙班
10. 抗抑郁药的合理应用与药学监护点是
- A. 剂量逐步递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小
- B. 应尽可能单一用药，应足量、足疗程治疗
- C. 对抑郁症应实施全程治疗，急性期治疗至少 3 个月
- D. 各种抗抑郁药均不宜与 MAOIs 类药物联合使用
- E. 多数抗抑郁药在开始用药后的 2 周内开始起效，但通常需要 4~6 周才产生充分效果