

护士执业资格考试：《答疑周刊》2022年第22期

1. 【问题】缺氧程度的判断鉴别？

【解答】

程度	呼吸困难	发绀	神志	血气分析	
				氧分压 (PaPO ₂) (kPa)	二氧化碳分压 (PaCO ₂) (kPa)
轻度	不明显	轻度	清楚【医学教育网原创】	>6.67	>6.6
中度	明显	明显	正常或烦躁不安	4.0~6.6	>9.3
重度	严重，三凹征明显	显著	昏迷或半昏迷	<4.0	>12.0

2. 【问题】人际认知效应常见效应的区别？

【解答】

首因效应 (第一印象)	指人在与他人首次接触时，根据对方的仪表、言语、举止等所做出的综合性判断【医学教育网原创】
近因效应	因最近或最后获得的信息而对总体印象产生最大影响的效应即为近因效应
社会固定印象 (刻板印象)	指某个社会文化环境对某一社会群体所形成的固定而概括的看法
晕轮效应 (光环效应)	指在人际交往过程中对一个人某种人格特征形成印象后，以此来推测此人其他方面的特征，从而导致高估或低估对方。分为正晕轮和负晕轮【医学教育网原创】
先礼效应	指在人际交往过程中向对方提出批评意见或某种要求时，先用礼貌语言行为起始，以便对方容易接受，从而达到自己的目的
免疫效应	指当一个人已经接受并相信某种观点时，便会对相反的观点产生一定的抵抗力，即具有一定的“免疫力”

3. 【问题】中药的煎煮时间表？

【解答】

	第一煎于沸后煮	第二煎于沸后煮
一般药	30 分钟	25 分钟
解表药	20 分钟	15 分钟
滋补药	60 分钟	50 分钟

4. 【问题】婴儿食物转换方法？

【解答】

	6 月龄	7~9 月龄	10~12 月龄
食物性状	泥状食物	末状食物	碎状、丁块状、指状食物
餐次	尝试，逐渐增加至 1 餐	4~5 次奶，1~2 餐其他食物	2~3 次奶，2~3 餐其他食物
乳类	纯母乳、部分母乳或配方奶；定时（3~4 小时）哺乳，5~6 次/日，奶量 800~1000ml/d；逐渐减少夜间哺乳	母乳、部分母乳或配方奶；4~5 次/日，奶量 800ml/d 左右 【医学教育网原创】	部分母乳或配方奶；约 2~3 次/日，奶量 600~800ml/d
谷类	选择强化铁的米粉，用水或奶调配；开始少量（1 勺）尝试，逐渐增加到每天 1 餐	强化铁的米粉、稠粥或面条，每日约 30~50g	软饭或面食，每日约 50~75g
蔬菜水果类	开始尝试蔬菜泥（瓜类、根茎类、豆类 1~2 勺，然后尝试水果泥 1~2 勺，每日 2 次）	每日碎菜 25~50g，水果 20~30g	每日碎菜 50~100g，水果 50g
肉类	尝试添加	开始添加肉泥、肝泥、动物血等动物性食品	添加动物肝脏、动物血、鱼虾、鸡鸭肉、红肉（猪肉、牛肉、羊肉等），每日 25~50g
蛋类	暂不添加	开始添加蛋黄，每日自 1/4 个逐渐增加至 1 个	1 个鸡蛋 【医学教育网原创】
喂养	用勺喂食	可坐在一高椅上与成人共进餐，开始学习用手自我喂食。可让婴儿手拿“条状”或“指状”食物，学	学习自己用勺进食；用杯子喝奶；每日和成人同桌进餐 1~2 次

		习咀嚼	
--	--	-----	--

