

医学教育网妇产科主治医师:《答疑周刊》2024年第11期

梅毒是由梅毒螺旋体引起的一种慢性传染病,临床表现复杂,几乎可侵犯全身各器官,造成多器官损害,对孕妇和胎儿均危害严重,梅毒螺旋体可以通过胎盘感染胎儿。下面通过几道题,练习一下!

问题索引:

1. 梅毒胎盘病理表现不正确的是?
2. 先天性梅毒脑脊液正常者治疗首选?
3. 对梅毒的治疗,下列哪项是错误的?
4. 梅毒经充分治疗后应随访?

具体解答:

1. 梅毒胎盘病理表现不正确的是

梅毒胎盘病理表现不正确的是

- A. 胎盘大而苍白
- B. 与胎儿重量比为 1: 4
- C. 光镜下见粗大、苍白“杵状”绒毛
- D. 胎盘小, 呈鲜红色
- E. 见“袖套”现象

【答案】D

【解析】梅毒胎盘大体: 梅毒的胎盘大而苍白。镜下: 见有粗大、苍白的“杵状”绒毛, 间质增生, 间质中血管呈内膜炎及周围炎改变, 并见狭窄的血管周围有大量中性粒细胞浸润形成“袖套现象”。故错误的是 D。[医学教育网原创]

2. 先天性梅毒脑脊液正常者治疗首选

先天性梅毒脑脊液正常者治疗首选

- A. 普鲁卡因青霉素
- B. 庆大霉素
- C. 苄星青霉素
- D. 喹诺酮类

E 林可霉素

**【答案】** C

**【解析】** 先天性梅毒脑脊液正常者治疗首选苄星青霉素。[医学教育网原创]

### 3. 对梅毒的治疗，下列哪项是错误的

对梅毒的治疗，下列哪项是错误的

A. 青霉素是首选药物

B. 对青霉素过敏者可用多西环素、红霉素

C. 母亲患有梅毒可经过胎盘传给胎儿而引起流产、早产、死胎，因此，孕期应积极治疗

D. 孕妇对青霉素过敏可选用红霉素

E. 因药物不足治疗不彻底，可转为潜伏梅毒，亦无传染性

**【答案】** E

**【解析】** 潜伏期梅毒是有传染性的。[医学教育网原创]

### 4. 梅毒经充分治疗后应随访

梅毒经充分治疗后应随访

A. 1~2 年

B. 6 个月至 1 年

C. 2~3 年

D. 5 年

E. 无需随访

**【答案】** C

**【解析】** 梅毒随访：1、早期梅毒治疗后第一年每 3 个月复查 1 次，以后每半年复查一次，连续 2~3 年。2、晚期梅毒治疗后复查同早期梅毒，但应连续观察 3 年，应做神经系统检查及脑脊液检查。3、妊娠梅毒治疗后，分娩前每月复查梅毒血清试验，分娩后观察同其他梅毒。故选 C。[医学教育网原创]