

医学教育网妇产科主治医师:《答疑周刊》2024年第18期

淋病是由对柱状上皮及移行上皮黏膜有亲和力的、革兰阴性双球菌也称淋病奈瑟菌(NG, 淋菌)引起的细菌性性传播疾病(STD), 主要表现为泌尿生殖系统的化脓性感染。以尿道炎和宫颈炎常见, 患者多有排尿困难、尿频、尿急、尿痛及阴道排出黏液或脓性分泌物的典型症状。下面通过几道题, 练习一下!

问题索引:

1. 下列哪项不是淋病的临床表现?
2. 关于淋菌感染, 哪项描述是正确的?
3. 妊娠合并淋病的临床表现是什么?

具体解答:

1. 下列哪项不是淋病的临床表现

下列哪项不是淋病的临床表现

- A. 淋病的潜伏期为两周
- B. 淋病早期局限于泌尿生殖道, 表现为尿频、尿痛、排尿困难, 黄色脓性白带
- C. 淋球菌沿生殖道黏膜上行传播, 易引起尿道旁腺炎、前庭大腺炎、宫颈管炎
- D. 淋病可上行引起子宫内膜炎、急性输卵管炎、输卵管卵巢囊肿、盆腔脓肿、弥漫性腹膜炎, 以致感染性休克
- E. 淋球菌可经血行传播引起播散性淋病

【答案】A

【解析】淋病的潜伏期为2~10天。[医学教育网原创]

2. 关于淋菌感染, 哪项描述是正确的

关于淋菌感染, 哪项描述是正确的

- A. 病原体检查取材部位最好是阴道上段
- B. 淋球菌主要侵袭生殖道黏膜的鳞状上皮
- C. 分泌物涂片在多核白细胞内找到数对革兰阴性双球菌可以诊断
- D. 淋病患者一般很少伴发尖锐湿疣
- E. 妇女感染淋病后3~7天均有症状

【答案】C

【解析】取尿道口或宫颈分泌物涂片，显微镜下见多核白细胞内有多个革兰阴性双球菌，可为初步诊断。故选 C。[医学教育网原创]

3. 妊娠合并淋病的临床表现是什么

女，30岁，孕18周，白带多，脓性，色黄，伴尿频、尿急、尿烧灼感3天。妇科检查：阴道内见大量黄色脓性分泌物，宫颈光滑、充血、水肿，子宫（-）。宫颈分泌物涂片在多核白细胞内找到革兰阴性双球菌。该患者最可能的诊断是

- A. 妊娠合并滴虫阴道炎
- B. 妊娠合并梅毒
- C. 妊娠合并淋病
- D. 妊娠合并外阴化脓性感染
- E. 妊娠合并巨细胞病毒感染

【答案】C

【解析】淋病性阴道炎患者的白带一般是呈脓性的，且量较多，主要是由淋病双球菌引发的，与不洁性交有关。一般无瘙痒症状。故选 C。[医学教育网原创]