

医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2024年第16期

问题索引：

1. 口腔健康教育的方法有哪几种？
2. 形成半月板的结构是什么？
3. 细菌侵入髓腔感染牙髓的途径有几种，分别是什么？
4. 吮拇指习惯容易造成什么类型的错（牙合）畸形？

具体解答：

1. 口腔健康教育的方法有哪几种？

常用口腔健康教育方法不包括

- A. 个别交谈
- B. 组织小型讨论会
- C. 组织社区活动
- D. 中小学校口腔流行病学调查
- E. 借助大众传播渠道

【答案】D

【解析】口腔健康教育的方法：[医学教育网原创]①大众传媒；②社区活动；③小型讨论会；④个别交谈。

2. 形成半月板的结构是什么？

能形成半月板的结构是

- A. 浆液腺泡
- B. 黏液腺泡
- C. 混合性腺泡
- D. 闰管
- E. 分泌管

【答案】C

【解析】混合性腺泡：[医学教育网原创]由黏液细胞和浆液细胞组成。前者组成腺泡之大部分，紧接闰管；后者呈新月状覆盖于腺泡的盲端表面，又名半月

板。浆液细胞的分泌物有细胞间小管通入腺泡腔内。

3. 细菌侵入髓腔感染牙髓的途径有几种，分别是什么？

细菌侵入髓腔感染牙髓的途径有两种，除了从冠部进入髓腔，另一种是

- A. 从口腔黏膜入侵
- B. 从牙龈入侵
- C. 从牙周膜入侵
- D. 从牙槽骨入侵
- E. 从侧副根管入侵

【答案】 E

【解析】细菌侵入髓腔感染牙髓的途径有两种：多数从冠方进入，也可经由根尖孔、牙根的侧副根管逆向进入髓腔[医学教育网原创]。

4. 吮拇指习惯容易造成什么类型的错（牙合）畸形？

吮拇指习惯易造成

- A. 前牙反颌
- B. 深覆盖
- C. 前牙梭形开颌
- D. 前牙圆形开颌
- E. 以上都不是

【答案】 D

【解析】不良口腔习惯是造成错（牙合）畸形的常见原因。例如咬上唇习惯易形成前牙反颌；咬下唇习惯会引起前牙深覆盖、[医学教育网原创]下颌后缩；伸舌习惯常使前牙梭形开颌；咬物或咬小指会形成局部小开颌；吮拇指习惯则易形成前牙圆形开颌。故本题选 D。