

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2024年第21期

问题索引:

- 1.【问题】漏出液与渗出液的发生机制有什么不同。
- 2.【问题】脑血栓形成和脑栓塞怎么区别?
- 3.【问题】阑尾炎后突然腹痛加重,范围加大,考虑什么?

具体解答:

- 1.【问题】漏出液与渗出液的发生机制有什么不同。

【解答】

积液	发生机制	常见原因
漏出液	毛细血管流体静压增高	静脉回流受阻、充血性心力衰竭和晚期肝硬化
	血浆胶体渗透压减低	血浆清蛋白浓度明显减低的各种疾病
	淋巴回流受阻	丝虫病、肿瘤压迫等所致的淋巴回流障碍
	钠水潴留	充血性心力衰竭、肝硬化和肾病综合征
渗出液	微生物的毒素、缺氧以及炎性介质	结核性、细菌性感染
	血管性物质增高、癌细胞浸润	转移性肺癌、乳腺癌、淋巴瘤、卵巢癌
	外伤、化学物质刺激等	血液、胆汁、胰液和胃液等刺激,外伤

- 2.【问题】脑血栓形成和脑栓塞怎么区别?

【解答】脑血栓形成是指在脑动脉粥样硬化等动脉病变基础上,脑部血管发生狭窄、闭塞或形成血栓,造成脑部血流中断;多见于50岁以上有动脉粥样硬化、高血压、高血脂、糖尿病者,安静或休息状态下发病,起病缓慢。

脑栓塞是血液中的各种栓子随血流进入脑动脉而阻塞血管,引起脑组织缺血性坏死,任何年龄均可发病,常见于风湿性心脏瓣膜病患者,安静与活动时均可发病,活动中突然发病常见,起病急。

3. 【问题】阑尾炎后突然腹痛加重，范围加大，考虑什么？

【解答】阑尾炎患者保守治疗后出现腹痛缓解后突然加重，范围加大，考虑为阑尾穿孔引起的腹膜炎体征。阑尾化脓、坏疽时有腹肌紧张、反跳痛，如腹膜刺激征范围扩大，说明阑尾发生穿孔。阑尾周围脓肿形成后，在右下腹触及边界不清和较为固定的压痛性包块。

